

JULIWA-HESA

DER RASENSPEZIALIST

60 Jahre
1965 – 2025



2025

Wir denken nach *haltig!* Eine Aufgabe für die Zukunft

*Der Rasenspezialist im Grasmantel
oder*


der Umschlag aus Graspapier

Rasen macht das Leben schöner, denn...

- **Rasen** bindet CO₂ und liefert Sauerstoff,
- **Rasen** führt zu einem ausgeglichenen Kleinklima an der Bodenoberfläche,
- **Rasen** senkt durch Verdunstung die Umgebungstemperatur,
- **Rasen** dient Spiel, Sport und Erholung.

Ohne Rasen ist die Welt ein Stück ärmer – jeder Quadratmeter Grün ist ein Beitrag zur Verbesserung von Umwelt und Klima.

Download
Kataloge



Der Innenteil unserer Broschüre und die Preisliste sind auf FSC®-zertifiziertem Recyclingpapier Vivus 100 gedruckt.

Oliver Höhn

Dipl. Ing. (FH) Landschaftsarchitektur

Kontakt

Mobil: 0172 - 6 69 55 54
hoehn@juliwa-hesa.de

PLZ Gebiete

70 - 73, 78
80 - 89
90 - 97

Manfred Klein

Gartenbautechniker

Kontakt

Mobil: 0173 - 6 51 88 88
klein@juliwa-hesa.de

PLZ Gebiete

32 - 35, 37
40 - 49
50 - 54, 56 - 59

Wilhelm Kost

Kontakt

Mobil: 0172 - 6 97 00 84
kost@juliwa-hesa.de

PLZ Gebiete

01 - 19
30, 31, 36, 38, 39
98, 99

Christine Kulick

Dipl.-Ing. (FH) Landschaftsarchitektur

Kontakt

Tel.: 0 62 21 - 82 66-13
Mobil: 0151 - 10 84 45 55
kulick@juliwa-hesa.de

PLZ Gebiete

55
60 - 69
74 - 77, 79

Zentrale Heidelberg

Fachberatung und Verkauf

Kontakt

Tel.: 0 62 21 - 82 66-66
Fax: 0 62 21 - 82 66-33

Mittelgewannweg 13
69123 Heidelberg
eMail: info@juliwa-hesa.de
www.juliwa-hesa.de

Sie erreichen uns:

von März bis September

Mo - Do 7.30 – 17.30 Uhr
Fr 7.30 – 15.00 Uhr

von Oktober bis Februar

Mo - Do 7.30 – 16.30 Uhr
Fr 7.30 – 12.15 Uhr

meiners saaten GmbH

Unser Vertriebspartner im Norden

Kontakt

Tel.: 0 42 44 - 92 64-0
Fax: 0 42 44 - 92 64-20
info@meiners-saaten.de



Fachberatung – unsere Stärke

Unser neuer Katalog bietet Ihnen erneut und aktualisiert umfangreiches Wissen und Informationen zum Thema Rasen. Eine gesonderte Preisliste ermöglicht Ihnen den Einsatz des Kataloges bei Ihren Kunden.

Unsere Fachberater:innen vor Ort und in der Zentrale stehen Ihnen bei Fragen zur Seite und unterstützen Sie bei der Lösung von Problemen.

JULIWA-HESA ist vertreten bei:



Baden-Württemberg e. V.
Hessen-Thüringen e. V.

DRG – Deutsche Rasengesellschaft e.V.
FLL – Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau e.V.
DEULA Rheinland
FLSF – Fördererkreis Landschafts- und Sportplatzbauliche Forschung e.V.
GVD – Greenkeeper Verband Deutschland
Heidelberger Rasentage – Verein zur Förderung moderner Rasenpflege e.V.

JULIWA-HESA

Geschäftsführung: Dr. Gabriela Schnotz, Richard Karl · HRB 335843 · Registergericht Mannheim

Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) können Sie unter www.juliwa-hesa.de einsehen und herunterladen, auf Anforderung senden wir sie gerne auch auf dem Postweg zu.

**Wenn Sie in Zukunft keine Informationen mehr von uns erhalten möchten,
benachrichtigen Sie uns bitte unter info@juliwa-hesa.de**

| | |
|---|--|
| <i>Inhalt</i> | Hier finden Sie unsere Produkte schnell und übersichtlich mit dem entsprechenden Seitenverweis. |
| <i>Zier- / Gebrauchsrasen</i> | Mischungen für Hausgärten, öffentliche Anlagen und Umgebungsflächen von Gebäuden, Neuansaat und Regenerationsmischungen (beinhaltet RSM 1 und 2) |
| <i>Sportrasen</i> | Vielfältige Varianten zur Neuansaat und Regeneration von Sportrasen und anderen strapazierten Flächen (beinhaltet RSM 3) |
| <i>Golfrasen</i> | Agrostis-Reinsaat und Mischungen für sämtliche Funktionsflächen auf Golfplätzen (beinhaltet RSM 4) |
| <i>Parkplatz / Dach</i> | Rund um die Begrünung von speziellen Standorten wie Parkplätzen und Dächern (beinhaltet RSM 5 und 6) |
| <i>Landschaftsrasen</i> | Mischungen mit geringem Pflegeaufwand, Erosionsschuttmatten, Haftkleber – alles, um Erosion zu vermeiden (beinhaltet RSM 7) |
| <i>Biotop / Blumenwiesen</i> | Standortgerechte Mischungen zur Begrünung von Flächen in der freien Landschaft sowie innerstädtischen Gebieten (beinhaltet RSM Regio und 8) |
| <i>LaFleur</i> | Blümmischungen, ein- und mehrjährig – eindrucksvolle Optik mit gleichzeitiger Förderung der Fauna im städtischen Bereich |
| <i>Standard / Landwirtschaft</i> | Ein attraktives Paket an Rasenmischungen für viele Einsatzzwecke, Mischungen für Wiesen und Weiden |
| <i>Dünger mineralisch</i> | Langzeit-Rasendünger mit Multicote®-Technologie, Programme für unterschiedlichste Rasenflächen |
| <i>Dünger flüssig</i> | Flüssige Spezialprodukte mit verschiedenen Nährstoffen, Pflanzenhilfsmittel, Taukontrolle und Netzmittel |
| <i>Dünger org.-min.</i> | Unsere BUGA®-Rasendünger aus hochwertigen organischen und mineralischen Bestandteilen, auch für Pflanzungen geeignet |
| <i>Fertigrasen</i> | Verschiedene Rasentypen für jeden denkbaren Einsatzzweck – die optimale Lösung für sofortige Begrünung |
| <i>Fachinfo</i> | Alle wichtigen Informationen zu Anlage und Pflege von Rasenflächen; mit Ratgeber zu Krankheiten und Fremddarten |

| Artikel | RSM | Zier- und Gebrauchsrasen | Inhalt ▶ | 10 kg | 5 kg | Seite |
|-------------|-------|---|----------|-------|------|-------|
| Z 111 | 1.1.1 | Zierrasen mit <i>Lolium perenne</i> | | • | | 13 |
| BUGA® Nr. 2 | | Teppichrasen | | • | • | 14 |
| BUGA® Nr. 5 | | Schattenrasen mit <i>Poa supina</i> | | • | • | 14 |
| BUGA® Nr. 9 | | BUGA Rasenzauber® | | • | • | 15 |
| G 221 | 2.2.1 | Gebrauchsrasen – Trockenlagen | | • | | 16 |
| G 222 | 2.2.2 | Gebrauchsrasen – Trockenlagen | | • | | 16 |
| G 230 | 2.3 | Gebrauchsrasen – Spielrasen | | • | • | 17 |
| G 231 | 2.3 | Gebrauchsrasen – Spielrasen mit <i>Poa supina</i> | | • | | 17 |
| 2301 | | Regeneration Hausgarten für Schattenlagen | | • | • | 18 |
| 2302 | | Regeneration Hausgarten | | • | • | 18 |
| 2303 | | Gebrauchsrasen mit Microclover® | | • | • | 19 |
| 2304 | | Mähroboterrasen | | • | • | 20 |
| 2305 | | Regeneration trockenheitsverträglich | | • | • | 19 |
| G 240 | 2.4 | Gebrauchsrasen – Kräuterrasen (17 % Kräuter) | | • | 1 kg | 21 |
| 2401 | | Gebrauchsrasen – Kräuterrasen (3,5 % Kräuter) | | • | | 21 |

| Artikel | RSM | Sportrasen | Inhalt ▶ | 10 kg | | Seite |
|-------------|-----|---|----------|-------|------------|-------|
| BUGA® Nr. 6 | | Sportrasen | | • | | 23 |
| S 310 | 3.1 | Sportrasen | | • | | 24 |
| S 311 | 3.1 | Sportrasen TURBO | | • | | 24 |
| S 312 | 3.1 | Sportrasen – EXTRA mit Poa pratensis QuickGerm® | | • | | 23 |
| 3102 | | siehe JH 28 | | | | 78 |
| 3103 | | Rustica | | • | | 25 |
| S 320 | 3.2 | Regenerationsrasen 100 % <i>Lolium perenne</i> | | • | | 26 |
| S 321 | 3.2 | Regenerationsrasen mit <i>Poa pratensis</i> | | • | | 26 |
| S 322 | 3.2 | Regenerationsrasen BlueVital NEU! | | • | | 27 |
| S 323 | 3.2 | Regenerationsrasen EXTRA, Poa pratensis QuickGerm® | | • | | 27 |
| 3201 | | Regenerationsrasen TOP Robust | | • | | 28 |
| 2305 | | Regeneration trockenheitsverträglich | | • | | 28 |
| 3202 | | Wintermix Regenerationsrasen | | • | | 29 |
| SOS | | Super Over Seeding, Regenerationsrasen | | | 15 kg-Sack | 29 |

| Artikel | RSM | Golfgrasen | Inhalt ▶ | 10 kg | Seite |
|------------------|-------|------------------------------|----------|--|-------|
| | | Agrostis – Sorten, Reinsaat | | versch. Gebinde (11,35 kg, 25 kg) | 31-32 |
| GOLF 412 | 4.1.2 | Green II – Green Standard | | • | 33 |
| GOLF 413 | 4.1.3 | Green III – Green Höhenlagen | | • | 33 |
| GOLF 414 | 4.1.4 | Green IV – Green Festuca | | • | 34 |
| GOLF 4105 | | Greens-Nachsaat | | • | 34 |
| GOLF 430 | 4.3 | Tee Standard | | • | 35 |
| GOLF 4301 | | Tee Schattenlagen | | • | 35 |
| GOLF 4302 | | Tee Quickspeed | | • | 36 |
| GOLF 441 | 4.4.1 | Fairway I | | • | 36 |
| GOLF 442 | 4.4.2 | Fairway II | | • | 37 |
| GOLF 443 | 4.4.3 | Fairway III | | • | 37 |
| GOLF 444 | 4.4.4 | Fairway IV | | • | 38 |
| GOLF 4401 | | Regeneration Fairway | | • | 38 |
| GOLF 450 | 4.5 | Semirough Standard | | • | 39 |
| GOLF 470 | | Hard-Rough Festuca | | • | 39 |

| Artikel | RSM | Parkplatzrasen | Inhalt ▶ | 10 kg | 5 kg | Seite |
|--------------|-----|--|----------|-------|------|-------|
| P 510 | 5.1 | Parkplatzrasen mit Achillea millefolium | | • | | 41 |
| P 511 | 5.1 | Parkplatzrasen – Standard | | • | | 41 |
| 5101 | | Super-Strap-Rasen robust | | • | • | 42 |
| 5103 | | Schotterrasen | | • | | 43 |
| 5104 | | Parkplatzrasen mit Kräutern | | • | | 43 |

| Artikel | RSM | Dachbegrünung | Inhalt ▶ | 1 kg | 100 g | Seite |
|---------------|-----|--------------------------------------|----------|---------------------------|-------|-------|
| D 610 | 6.1 | Extensive Dachbegrünung | | • | • | 44 |
| 6101 | | Dachgarten mit Kräutern | | • | • | 44 |
| 434001 | | Sedum-Sprossen | | ab 1 kg | | 45 |
| VMS | | Vorkultivierte Vegetationsmatten | | ab 5 m² | | 46 |
| 434168 | | Flachballenpflanzen (Sedum, Kräuter) | | 50 Stück/Platte | | 47 |

| Artikel | RSM | Landschaftsrasen | Inhalt ▶ | 10 kg | Seite |
|---------|-------|--|----------|-------|-------|
| L 711 | 7.1.1 | Landschaftsrasen – Standard | | • | 49 |
| L 712 | 7.1.2 | Landschaftsrasen – Standard mit Kräutern | | • | 49 |
| L 721 | 7.2.1 | Landschaftsrasen – Trockenlagen | | • | 50 |
| L 722 | 7.2.2 | Landschaftsrasen – Trockenlagen mit Kräutern | | • | 50 |
| L 730 | 7.3 | Landschaftsrasen – Feuchtlagen | | • | 51 |
| 7301 | | Sickerrasen | | • | 51 |
| L 740 | 7.4 | Landschaftsrasen – Halbschatten | | • | 52 |
| 7901 | | Extensivmischung | | • | 53 |
| 7902 | | Untersaat | | • | 53 |

| Artikel | Erosionsschutz | | Seite |
|-------------|---|-----------------------------|-------|
| HK 1 | Haftkleber Verdyol® super | 15 kg | 54 |
| SMJ/SMP | Strohmatte, mit Jute oder PP vernetzt und versteppt | Rollen à 100 m ² | 55 |
| SKMJ/SKMP | Stroh-Kokos-Matte, mit Jute oder PP vernetzt und versteppt | | |
| KMJ/KMP | Kokosmatte, mit Jute oder PP vernetzt und versteppt | | |
| K 400/K 700 | Kokosgewebe, Gewicht ca. 400 g/m ² oder ca. 700 g/m ² | Rollen á 100 m ² | |
| J 500 | Jutemaschengewebe, Gewicht ca. 500 g/m ² | Ballen à 670 m ² | |

| Artikel | Regio-Saatgut RegioZert® | | Seite |
|---------|---|---------------------|-------|
| 9610 | Regio Frischwiese, Grundmischung | Mindestabnahme 3 kg | 58 |
| 9620 | Regio Sandmagerrasen, für saure trockene Standorte | | |
| 9630 | Regio Kalkmagerrasen, für basische trockene Standorte | | |
| 9640 | Regio Feuchtwiese, Ufermischung, wechselfeuchte Standorte | | |
| 9660 | Regio-Mischung Böschung 70/30 | | |
| 9670 | Regio-Mischung Böschung 85/15 | | |
| 9680 | Regio-Mischung Feldrain 10/90 | | |



| Artikel | Regio-Saatgut VWW Regiosaaten® | Seite |
|---------|--|-------------------------------|
| 9460 | Blumenwiese Nr. 1 | Mindestabnahme 3 kg 59 |
| 9463 | Frischwiese / Fettwiese Nr. 2 | |
| 9469 | Böschungen / Straßenbegleitgrün Nr. 3 | |
| 9471 | Salzverträgliche Bankettmischung Nr. 4 | |
| 9462 | Mager- und Sandrasen Nr. 5 | |
| 9474 | Feuchtwiese Nr. 6 | |
| 9475 | Ufersaum Nr. 7 | |
| 9472 | Schmetterlings- und Wildbienensaum Nr. 8 | |

| Artikel | RSM | Biotopmischungen | Inhalt ▶ | 10 kg | 1 kg | Seite |
|---------|-------|--|----------|-------|------|-------|
| B 811 | 8.1.1 | Extensiv-Grünland, Grundmischung | | • | • | 58 |
| B 812 | 8.1.2 | Extensiv-Grünland für Mager-Standorte, sauer | | • | • | 58 |
| B 813 | 8.1.3 | Extensiv-Grünland für Mager-Standorte, neutral bis alkalisch | | • | • | 59 |
| B 814 | 8.1.4 | Extensiv-Grünland für Halb- und Teilschattenbereiche | | • | • | 59 |

| Artikel | Blumenwiesen – reines Saatgut | Inhalt ▶ | 10 kg | 5 kg | 1 kg | Seite |
|---------|---|----------|-------|------|--------------------|-------|
| 9010 | Blumenwiese für alle Böden | | • | • | | 60 |
| 9020 | Blumen- / Kräuternachsaat für alle Böden | | | | 1 kg/ 100 g | 60 |
| 9090 | Blumenwiese Kelly® | | • | | • | 61 |
| 9401 | Blumenwiese (50 % Gräser, 50 % Kräuter inkl. Saathilfe) | | • | | • | 61 |

| Artikel | Blühhmischungen – LaFleur | Inhalt ▶ | 1 kg | 100 g | Seite |
|---------|---|----------|------|-------|-------|
| 9250 | Veitshöchheimer Bienenweide | | • | | 67 |
| 9300 | Sommerzauber – Pflückmischung | | • | • | 67 |
| 9310 | LaFleur petit – Der Bodendecker | | • | • | 68 |
| 9320 | LaFleur sec – Die Trockene | | • | • | 68 |
| 9330 | LaFleur chrono – Der Allrounder | | • | • | 69 |
| 9345 | LaFleur chaleur – Warme Töne! | | • | • | 70 |
| 9346 | LaFleur pastelle – Die Sanfte | | • | • | 70 |
| 9350 | LaFleur miel – Die Honigspenderin | | • | • | 71 |
| 9360 | LaFleur mini – Der Zwerg unter den Mischungen | | • | • | 71 |

Unsere Blühhmischungen sind nur in den angegebenen Packungsgrößen lieferbar (1 kg- oder 100 g-Tüten)

| Artikel | Blühtmischungen – LaFleur | Inhalt ► | 1 kg | 100 g | Seite |
|---------|---|----------|------|-------|-------|
| 9391 | LaFleur Poésie – Der Frühlingsblüher | | • | • | 72 |
| 9392 | LaFleur Ténor – Die Bunte | | • | • | 72 |
| 9393 | LaFleur demi Ombre – Die Schattenverträgliche | | • | • | 73 |
| 9394 | LaFleur Extrême – Die Flexible | | • | • | 74 |
| 9395 | LaFleur Naturelle – Artenvielfalt Fauna und Flora | | • | • | 74 |
| 9396 | LaFleur Universelle - alle Standorte | | • | • | 75 |
| 9397 | LaFleur Rustique - die Robuste | | • | • | 75 |

Unsere Blühtmischungen sind nur in den angegebenen Packungsgrößen lieferbar (1 kg- oder 100 g-Tüten)

| Artikel | Standardmischungen | Inhalt ► | 10 kg | Seite |
|---------|-------------------------------------|----------|-------|-------|
| JH 20 | Spiel- und Sportrasen | | • | 77 |
| JH 22 | Berliner Tiergartenrasen | | • | 77 |
| JH 23 | Zier- und Gebrauchsrasen, Parkrasen | | • | 78 |
| JH 28 | JUVENTUS Sprinterrasen | | • | 78 |
| JH 30 | Schattenrasen | | • | 79 |
| JH 31 | Böschungsmischung mit Klee | | • | 79 |
| JH 32 | Böschungsmischung ohne Klee | | • | 80 |
| JH 35 | Kräuterwiese | | • | 80 |

| Artikel | Landwirtschaft | Inhalt ► | 10 kg | Seite |
|---------|------------------------|----------|-------------|-------|
| LW 1 | Dauerwiese | | • | 81 |
| LW 2 | Dauerweide | | • | 81 |
| LW 3 | Wildwiese, mehrjährig | | • | 82 |
| LW 4 | Pferdeweide ohne Klee | | • | 82 |
| LW 5 | Sommergrün | | • | 83 |
| LW 6 | Kräuter-Zusatzmischung | | 1 kg/ 100 g | 83 |

| mineralische Dünger | | | | |
|---------------------|-----------------------|------------------|-------------|-------|
| Artikel | Magic-Programm | Nährstoffgehalte | % N umhüllt | Seite |
| GMV | Multigreen Multiverdo | 12-0-42 (-2) | | 88 |
| EMP | Magic Printempo | 23-5-11 (-2) | 50 | 88 |
| EMS | Magic Somero | 17-2-17 (-3) | 40 | 89 |
| EMA | Magic Autuno | 13-4-20 (-4) | 50 | 89 |

| Classic-Programm | | | | |
|------------------|------------------------------|--------------|----|----|
| GCP | Multigreen Classic Printempo | 24-6-14 (-3) | 50 | 90 |
| GCS | Multigreen Classic Somero | 26-5-20 | 40 | 90 |
| GCA | Multigreen Classic Autuno | 18-0-30 (-3) | 50 | 91 |

| sonstige Dünger | | | | |
|-----------------|------------------------------------|-------------|----|----|
| GU | Multigreen Universal | 30-8-8 | 85 | 92 |
| GR | Multigreen Starter | 23-24-10 | 25 | 92 |
| GN | Multigreen Quickstart (20 kg-Sack) | 42-0-0 | 57 | 93 |
| GS | Turfpower Standard | 30-5-8 (-3) | 40 | 93 |

| Greens-Programm | | | | |
|-----------------|----------------------|---------------|---------|----|
| GHP | Hi-Green Printempo | 22-5-10 (-2) | 53 % MU | 94 |
| GHK | Hi-Green NK | 15-5-25 (-2) | 33 % MU | 94 |
| GHR | Hi-Green Starter | 16-23-10 (-3) | 31 % MU | 95 |
| FER | Greentec Eisendünger | 4-0-14+9 Fe | | 95 |

Unsere Leistungen für Sie:

- Umgehende und zuverlässige Lieferung von Saatgutmischungen und Dünger
- Produktion von Spezialmischungen nach Ihren Wünschen

Bei mangelnder Verfügbarkeit behalten wir uns vor, Sorten in den Mischungen durch gleichwertige oder bessere zu ersetzen.

| Artikel | Flüssigdünger | Nährstoffgehalte | Verpackungseinheit | Versandeinheit | Seite |
|---------|----------------|---------------------|--------------------|-------------------|-------|
| HSP | Seamac ProTurf | 5 % Fe | 10 Kanister | 2 x 10 Kanister | 98 |
| HAS | Ascoflex | Pflanzenhilfsmittel | 10 Kanister | 2 x 10 Kanister | 98 |
| HNS | Protec Plus | 28-0-0 | 10 Kanister | 2 x 10 Kanister | 99 |
| HTU | Turfite SR3 | Pflanzenhilfsmittel | 10 Kanister | 2 x 10 Kanister | 99 |
| HVNK | Protec NK | 8-0-8 | 10 Kanister | 2 x 10 Kanister | 100 |
| HVK | Protec K | 0-0-25 | 10 Kanister | 2 x 10 Kanister | 100 |
| HTH | Turf Hardener | 8 (-9-2) | 10 Kanister | 2 x 10 Kanister | 101 |
| HEV | Elevate | 6-0-0+5Fe | 10 Kanister | 2 x 10 Kanister | 101 |
| HTC | Turfcomplex | Spurennährstoffe | 10 Kanister | 2 x 10 Kanister | 102 |
| HTE | TEMAG Elite | Spurennährstoffe | 6 kg-Karton | | 102 |

| Artikel | Netzmittel | Verpackungseinheit | Versandeinheit | Seite |
|---------|------------------|--------------------|-------------------|-------|
| DEW | DewCure | 10 Kanister | 2 x 10 Kanister | 104 |
| TRIC | TriCure Fluid | 10 Kanister | 2 x 10 Kanister | 105 |
| TRI | TriCure Granular | 18,14 kg-Sack | | 105 |



- Hochwertige Komponenten
- Modernste Produktionsanlagen
- Kompetente Beratung
- Intelligente Logistik
- Schnelle und sichere Belieferung!

| Artikel | organisch-mineralische Rasendünger | Nährstoffgehalte | Seite |
|---------|------------------------------------|---|-------|
| D 2 | BUGA® Spezial | 12-4-8 (-3) | 108 |
| D 3 | BUGA® Minikon | 12-4-8 (-3) | 108 |
| D 4 | BUGA® Mycostart – Bodenaktivator | 4-3,5-2 | 109 |
| D 5 | BUGA® Herbst | 6-3-18 (-3) | 109 |
| D 6 | BUGA® Aktiv mit Bacillus subtilis | 12-1,5-6 (-2) + 0,5 | 110 |
| D 7 | BUGA® Vegalin | 8-4-8 (-3) | 110 |
| D 8 | BUGA® Natur-Rasendünger | 6-4-9 | 111 |
| D 9 | BUGA® Rasenkalk | 80 % CaCO ₃ , 11 % MgCO ₃ | 111 |

| Artikel | Fertigrasen | Seite |
|------------|---------------------------------------|-------|
| F 1 | BUGA® Sportrasen – nach DIN 18035 / 4 | 114 |
| F 2 | Gebrauchsrasen – Spielrasen | 114 |
| F 8 | Rustica | 115* |
| F 4 / F 44 | Fertigrasen für Schattenlagen | 115* |

* nicht immer verfügbar – bitte fragen Sie nach

| Artikel | Holznägel | Seite |
|---------|--------------------------------------|-------|
| HN 1 | Holznägel, gespitzt 20 x 10 x 200 mm | 115 |

Fachinformation ab Seite 116





ZIERRASEN GEBRAUCHSRASEN

Die Allrounder

| | |
|------------------------|----------|
| Zierrasen | S. 13 |
| BUGA®-Gebrauchsrasen | S. 14/15 |
| Gebrauchsrasen | S. 16/17 |
| Regenerationsrasen | S. 18 |
| Gebrauchsrasen trocken | S. 19 |
| Mähroboterrasen | S. 20 |
| Kräuterrasen | S. 21 |

Z 111 Zierrasen mit Lolium perenne, RSM 1.1.1

- JULIWA-HESA-Qualität 7,6 (RSM-Mindestanforderung 6,7)
- **dichtnarbiger, feinblättriger Rasen**
- mittelschnelle Anfangsentwicklung durch Lolium-Anteil
- geringe Krankheitsanfälligkeit
- repräsentative Flächen mit geringer Belastung
- hoher Pflegeaufwand (Vertikutieren!)

Empfohlene Ansaatmenge: ca. 25 g/m²

- **10 kg** ausreichend für ca. **400 m²**

Zusammensetzung

| | | |
|--------|----------------------------|------------|
| 30,0 % | Festuca rubra commutata | MUSICA |
| 20,0 % | Festuca rubra rubra | ROSSINANTE |
| 30,0 % | Festuca rubra trichophylla | PINAFORÉ |
| 20,0 % | Lolium perenne | EVENTUS |



BUGA® Nr. 2 Teppichrasen / Zier- und Gebrauchsrasen

- hohe Narbendichte und Feinblättrigkeit bei mittlerer Strapazierfähigkeit
- hochwertigste Sorten mit sehr guter Rasenqualität
- **optisch Zierrasencharakter, aber dennoch gut belastbar**
- schnelle Anfangsentwicklung
- ausgewählte Partien mit höchster Reinheit und Keimfähigkeit

Empfohlene Ansaatmenge: ca. 25 g/m²

- **10 kg** ausreichend für ca. **400 m²**
- **5 kg** ausreichend für ca. **200 m²**

Zusammensetzung

| | | |
|--------|----------------------------|------------|
| 10,0 % | Festuca rubra commutata | GREENMILE |
| 15,0 % | Festuca rubra rubra | ROSSINANTE |
| 10,0 % | Festuca rubra trichophylla | PINAFORÉ |
| 25,0 % | Lolium perenne | COLETTA |
| 20,0 % | Lolium perenne | OASE |
| 10,0 % | Poa pratensis | LIMOUSINE |
| 10,0 % | Poa pratensis | YVETTE |

BUGA® Nr. 5 Schattenrasen mit Poa supina

- strapazierfähige Rasenflächen **an halbschattigen Standorten**
- reduzierte Ausdauer im Vollschaten, daher ist regelmäßige Nachsaat nötig
- hoher Wasser- und Nährstoffbedarf
- regelmäßige Düngung und Schnitt sind besonders wichtig

Empfohlene Ansaatmenge: ca. 25 g/m²

- **10 kg** ausreichend für ca. **400 m²**
- **5 kg** ausreichend für ca. **200 m²**

Zusammensetzung

| | | |
|--------|-------------------------|-------------|
| 15,0 % | Festuca rubra rubra | ROSSINANTE |
| 15,0 % | Festuca rubra commutata | GREENMILE |
| 25,0 % | Lolium perenne | EURODIAMOND |
| 20,0 % | Lolium perenne | OASE |
| 10,0 % | Poa pratensis | JULIUS |
| 10,0 % | Poa pratensis | BONAIRE |
| 5,0 % | Poa supina | SUPREME |

BUGA® Rasenmischungen – unsere Besten –

BUGA® Rasenmischungen aus dem Hause **JULIWA-HESA** stehen für besondere Ansprüche und sind sowohl für die Neuanlage als auch für die Nachsaat von bestehenden Rasenflächen bestens geeignet.

Die ausgewogenen Sortenzusammenstellungen, verbunden mit höchster Reinheit und Keimfähigkeit der verwendeten Partien machen das BUGA® Rasenmischungs-Programm einzigartig.

Wir verwenden aktuelle Spitzensorten mit Bestnoten in:

- **Aussehen und Erscheinungsbild**
- **Krankheitsresistenzen**
- **Belastbarkeit und Regenerationsvermögen**

BUGA® Nr. 9 BUGA-Rasenzauber®

- **der superschnelle Rasen für zufriedene Kunden**
- feinblättrige Sorten für hohe Ansprüche
- schnelle Anfangsentwicklung
- gute Unkrautunterdrückung
- hochbelastbar durch Sorten mit Spitzenbewertungen
- für das BUGA® Programm verwenden wir nur bestes Saatgut

Empfohlene Ansaatmenge: ca. 25 g/m²

- **10 kg** ausreichend für ca. **400 m²**
- **5 kg** ausreichend für ca. **200 m²**

Zusammensetzung

| | | |
|--------|-------------------------|------------|
| 10,0 % | Festuca rubra rubra | ROSSINANTE |
| 10,0 % | Festuca rubra commutata | GREENMILE |
| 30,0 % | Lolium perenne | COLETTA |
| 15,0 % | Lolium perenne | FABIAN |
| 15,0 % | Lolium perenne | TURFGOLD |
| 10,0 % | Poa pratensis | MIRACLE |
| 10,0 % | Poa pratensis | SOMBRERO |



Zier/Gebrauch

G 221 Gebrauchsrasen – Trockenlagen, RSM 2.2.1

- JULIWA-HESA-Qualität 7,0 (RSM-Mindestanforderung 6,3)
- **trockenheitsverträglicher, langsam wachsender Rasen**
- geringe bis mittlere Belastbarkeit
- langsame Anfangsentwicklung
- dadurch bedingt evtl. stärkerer Unkrautdruck möglich
- geringe Nährstoffansprüche

Empfohlene Ansaatmenge: ca. 25 g/m²

- 10 kg ausreichend für ca. 400 m²

Zusammensetzung

| | | |
|--------|----------------------------|-----------|
| 20,0 % | Festuca rubra commutata | CHARACTER |
| 15,0 % | Festuca rubra commutata | GREENMILE |
| 15,0 % | Festuca rubra rubra | DIPPER |
| 5,0 % | Festuca rubra trichophylla | BORLUNA |
| 20,0 % | Festuca ovina | BLUES |
| 15,0 % | Poa pratensis | MIRACLE |
| 10,0 % | Poa pratensis | ZEPTOR |

G 222 Gebrauchsrasen – Trockenlagen, RSM 2.2.2

- JULIWA-HESA-Qualität 6,6 (RSM-Mindestanforderung 6,0)
- mit Festuca arundinacea – Rohrschwengel
- **trockenheitsverträglich durch tiefgründiges Wurzelsystem**
- geringe bis mittlere Pflegeansprüche
- auch für unbelastete Halbschattenlagen geeignet

Empfohlene Ansaatmenge: ca. 35 g/m²

- 10 kg ausreichend für ca. 250-300 m²

Zusammensetzung

| | | |
|--------|---------------------|-----------|
| 50,0 % | Festuca arundinacea | AMARELLO |
| 30,0 % | Festuca arundinacea | DEBUSSY 1 |
| 10,0 % | Lolium perenne | TURFGOLD |
| 10,0 % | Poa pratensis | ZEPTOR |

mit *Poa supina*

G 230 Gebrauchsrasen – Spielrasen, RSM 2.3

- JULIWA-HESA-Qualität 6,9 (RSM-Mindestanforderung 6,4)
- Allroundrasen mit hoher Anpassungsfähigkeit
- **für alle Böden und Lagen geeignet**
- für mittel strapazierte Spielwiesen, Parkflächen, Hausgärten
- schnelle Anfangsentwicklung durch Weidelgräser

Empfohlene Ansaatmenge: ca. 25 g/m²

- **10 kg** ausreichend für ca. **400 m²**
- **5 kg** ausreichend für ca. **200 m²**

Zusammensetzung

| | | |
|--------|----------------------------|------------|
| 5,0 % | Festuca rubra commutata | CHARACTER |
| 10,0 % | Festuca rubra commutata | GREENMILE |
| 15,0 % | Festuca rubra rubra | MAXIMA 1 |
| 15,0 % | Festuca rubra trichophylla | MIRADOR |
| 25,0 % | Lolium perenne | ESQUIRE |
| 15,0 % | Lolium perenne | JUBILEE EG |
| 10,0 % | Poa pratensis | MIRACLE |
| 5,0 % | Poa pratensis | ZEPTOR |

G 231 Gebrauchsrasen – Spielrasen, RSM 2.3

- JULIWA-HESA-Qualität 7,5 (RSM-Mindestanforderung 6,5)
- durch den *Poa supina*-Anteil **für teilschattige und feuchte Standorte geeignet**
- benötigt höhere Wasser- und Nährstoffgaben als die G 230
- auf regelmäßigen, aber nicht zu tiefen Schnitten achten

Empfohlene Ansaatmenge: ca. 25 g/m²

- **10 kg** ausreichend für ca. **400 m²**

Zusammensetzung

| | | |
|--------|----------------------------|-----------|
| 25,0 % | Festuca rubra commutata | CHARACTER |
| 10,0 % | Festuca rubra rubra | DIPPER |
| 5,0 % | Festuca rubra trichophylla | BORLUNA |
| 25,0 % | Lolium perenne | OASE |
| 15,0 % | Lolium perenne | DICKENS 1 |
| 5,0 % | Poa pratensis | SOMBRERO |
| 10,0 % | Poa pratensis | JULIUS |
| 5,0 % | Poa supina | SUPREME |



Zier/Gebrauch

2301 Regeneration für Schattenlagen mit Poa supina

- für die Nachsaat aller Gebrauchsrasenflächen
- **speziell für den Einsatz auf schattigen Flächen**
- schnelle Keimung und gute Konkurrenzkraft (Lolium perenne)
- verbessert den Rasenaspekt bei guter Pflege innerhalb weniger Wochen

Empfohlene Nachsaatmenge: ca. 25 g/m²

- **10 kg** ausreichend für ca. **400 m²**
- **5 kg** ausreichend für ca. **200 m²**

Zusammensetzung

| | | |
|--------|----------------------------|-----------|
| 15,0 % | Festuca rubra rubra | DIPPER |
| 5,0 % | Festuca rubra trichophylla | PINAFORE |
| 35,0 % | Lolium perenne | OASE |
| 30,0 % | Lolium perenne | DICKENS 1 |
| 10,0 % | Poa pratensis | JULIUS |
| 5,0 % | Poa supina | SUPREME |

2302 Regeneration Hausgarten

- Alternative zur Regeneration Sportrasen
- mit allen Grasarten des Gebrauchsrasen ausgestattet
- **Erhaltung des feinblättrigen Aspektes** durch Rotschwingelanteile
- schnelle Keimung und gute Konkurrenzkraft (Lolium perenne)

Empfohlene Nachsaatmenge: ca. 25 g/m²

- **10 kg** ausreichend für ca. **400 m²**
- **5 kg** ausreichend für ca. **200 m²**

Zusammensetzung

| | | |
|--------|---------------------|------------|
| 20,0 % | Festuca rubra rubra | MAXIMA 1 |
| 30,0 % | Lolium perenne | ESQUIRE |
| 25,0 % | Lolium perenne | ROKADE |
| 20,0 % | Lolium perenne | JUBILEE EG |
| 5,0 % | Poa pratensis | MIRACLE |

2303 Gebrauchsrasen mit Microclover®

- kleinblättriger, niedrig wachsender Rasen-Weißklee
- reduzierte Blütenbildung im Gegensatz zum gängigen Weißklee
- **satter Grünaspekt der Fläche auch über Trockenphasen hinweg**
- durch Stickstoff-Fixierung des Klees kann pro Jahr eine Düngung eingespart werden
- besonders geeignet für extensivere Grünflächen

Empfohlene Ansaatmenge: ca. 25 g/m²

- **10 kg** ausreichend für ca. **400 m²**
- **5 kg** ausreichend für ca. **200 m²**

Zusammensetzung

| | | |
|--------|----------------------------|------------|
| 15,0 % | Festuca rubra rubra | MAXIMA 1 |
| 5,0 % | Festuca rubra trichophylla | BORLUNA |
| 20,0 % | Lolium perenne | PASCAL |
| 30,0 % | Lolium perenne | JUBILEE EG |
| 20,0 % | Poa pratensis | MIRACLE |
| 10,0 % | Trifolium repens | PIPOLINA |



2305 Regeneration trockenheitsverträglich

- Hitzeverträglich
- Trockenheitsverträglichkeit
- Gute Regenerationsfähigkeit
- Geringe Krankheitsanfälligkeit
- **Geeignet für die Regeneration und Neuanlage von Hausgartenflächen**

Empfohlene Nachsaatmenge: ca. 25 g/m²

- **10 kg** ausreichend für ca. **400 m²**
- **5 kg** ausreichend für ca. **200 m²**

Zusammensetzung

| | | |
|--------|----------------|------------|
| 35,0 % | Lolium perenne | DOUBLE |
| 30,0 % | Lolium perenne | FABIAN |
| 10,0 % | Lolium perenne | TETRAMAGIC |
| 10,0 % | Poa pratensis | ZEPTOR |
| 15,0 % | Poa pratensis | MIRACLE |



2304 Mähroboter-Rasen

- extra entwickelt für den Einsatz von Mährobotern
- sauberes Schnittbild
- **geeignet für besonnte UND schattige Flächen !**
- biologisch gut abbaubares Schnittgut
- durch Nährstoffrückführung kann eine Düngung pro Jahr eingespart werden

Empfohlene Ansaatmenge: ca. 25 g/m²

- **10 kg** ausreichend für ca. **400 m²**
- **5 kg** ausreichend für ca. **200 m²**

Zusammensetzung

| | | |
|--------|----------------------------|-----------|
| 10,0 % | Festuca rubra commutata | GREENMILE |
| 7,5 % | Festuca rubra trichophylla | MIRADOR |
| 25,0 % | Lolium perenne | DICKENS 1 |
| 30,0 % | Lolium perenne | OASE |
| 20,0 % | Poa pratensis | JULIUS |
| 7,5 % | Poa supina | SUPREME |





G 240 Gebrauchsrasen – Kräuterrasen, RSM 2.4

- JULIWA-HESA-Qualität 6,6 (RSM-Mindestanforderung 5,9)
- **hoher Kräuteranteil – 17 %**
- Entwicklung von artenreichen Naturrasen auf mageren Standorten
- Alternative zu Blumenwiesen – geringere Wuchshöhe
- kann 4-8 mal / Jahr gemäht werden (mit Rasenmäher möglich)
- Schnittgut trocknen lassen (Samenausfall) und danach entfernen

Empfohlene Ansaatmenge: ca. 10 g/m²

- **10 kg** ausreichend für ca. **1000 m²**
- **1 kg** ausreichend für ca. **100 m²**

Zusammensetzung

| | | |
|--------|----------------------------|----------------------------|
| 5,0 % | Agrostis capillaris | HIGHLAND |
| 20,0 % | Festuca rubra commutata | CHARACTER |
| 20,0 % | Festuca rubra rubra | MAXIMA 1 |
| 15,0 % | Festuca rubra trichophylla | PINAFORÉ |
| 5,0 % | Festuca trachyphylla | HARDTOP |
| 3,0 % | Lolium perenne | TRANSATE |
| 15,0 % | Poa pratensis | ZEPTOR |
| 0,5 % | Achillea millefolium | |
| 0,3 % | Bellis perennis | |
| 0,5 % | Centaurea jacea | |
| 0,5 % | Crepis capillaris | |
| 1,0 % | Dianthus deltoides | |
| 0,2 % | Galium mollugo | |
| 0,2 % | Galium verum | |
| 0,5 % | Leontodon autumnalis | |
| 0,8 % | Leontodon hispidus | |
| 2,0 % | Leucanthemum vulgare | |
| 1,0 % | Lotus corniculatus | 1,5 % Salvia pratensis |
| 0,5 % | Medicago lupulina | 1,0 % Sanguisorba minor |
| 1,0 % | Plantago media | 1,5 % Thymus pulegioides |
| 0,5 % | Potentilla verna | 1,0 % Trifolium incarnatum |
| 2,0 % | Prunella vulgaris | 0,5 % Trifolium pratense |

2401 Gebrauchsrasen – Kräuterrasen

- **Kräuteranteil 3,5 %**
- Eigenschaften ähnlich G 240, aber deutlich weniger Kräuter im Bestand
- kann 4-8 mal / Jahr gemäht werden (mit Rasenmäher möglich)
- Schnittgut trocknen lassen (Samenausfall) und danach entfernen

Empfohlene Ansaatmenge: ca. 15 g/m²

- **10 kg** ausreichend für ca. **650 m²**

Zusammensetzung

| | | |
|--------|---------------------------------|-----------|
| 5,0 % | Agrostis capillaris | HIGHLAND |
| 19,5 % | Festuca rubra commutata | CHARACTER |
| 40,0 % | Festuca rubra rubra | MAXIMA 1 |
| 10,0 % | Festuca rubra trichophylla | PINAFORÉ |
| 5,0 % | Festuca trachyphylla | HARDTOP |
| 15,0 % | Poa pratensis | MIRACLE |
| 2,0 % | Poa trivialis | DASAS |
| 0,1 % | Achillea millefolium | |
| 0,2 % | Bellis perennis | |
| 0,5 % | Dianthus deltoides | |
| 0,4 % | Galium verum | |
| 0,4 % | Leontodon autumnalis / hispidus | |
| 0,2 % | Leucanthemum vulgare | |
| 0,2 % | Lotus corniculatus | |
| 0,3 % | Plantago media | |
| 0,7 % | Prunella vulgaris | |
| 0,2 % | Ranunculus bulbosus | |
| 0,3 % | Thymus pulegioides | |



SPORTRASEN

Belastung inklusive

| | |
|--------------------------------------|----------|
| Premium-Sportrasen | S. 23 |
| Sportrasen – Neuanlage RSM 3.1 | S. 24 |
| Sportrasen trockenheitsverträglich | S. 25 |
| Sportrasen Regeneration RSM 3.2 | S. 26-27 |
| Regeneration trockenheitsverträglich | S. 28 |
| Regeneration Winter | S. 29 |

BUGA® Nr. 6 Sportrasen

- **extrem dichtnarbiger, belastbarer Rasen**
- feinerer Gesamtaspekt als RSM-Sportrasenmischungen
- durch Festuca-Anteil bessere Etablierungsmöglichkeiten für die Wiesenrispe
- neben Sportflächen auch für belastete Hausgärten geeignet
- schnelle Anfangsentwicklung durch Weidelgräser

Empfohlene Ansaatmenge: ca. 25 g/m²

- **10 kg** ausreichend für ca. **400 m²**

Zusammensetzung

| | | |
|--------|----------------------------|-----------|
| 10,0 % | Festuca rubra trichophylla | PINAFORE |
| 25,0 % | Lolium perenne | COLETTA |
| 20,0 % | Lolium perenne | OASE |
| 10,0 % | Poa pratensis | DAUNTLESS |
| 15,0 % | Poa pratensis | LIMOUSINE |
| 20,0 % | Poa pratensis | SOMBRERO |

S 312 Sportrasen EXTRA – RSM 3.1

QuickGerm®

- JULIWA-HESA-Qualität 8,5 (RSM-Mindestanforderung 6,7)
- nur Sorten mit den höchsten RSM-Bewertungen
- Verwendung von vorgekeimten Wiesenrispen
- **QuickGerm® – unser Verfahren zur Vorkeimung** (siehe auch Seite 27)
- schnellere Keimung bewirkt höhere Anteile an Wiesenrispe im Bestand

Empfohlene Ansaatmenge: ca. 25 g/m²

- **10 kg** ausreichend für ca. **400 m²**

Zusammensetzung

| | | |
|--------|----------------|-----------------------|
| 30,0 % | Lolium perenne | COLETTA |
| 20,0 % | Lolium perenne | OASE |
| 20,0 % | Poa pratensis | JULIUS - QuickGerm® |
| 20,0 % | Poa pratensis | LIMOUSINE |
| 10,0 % | Poa pratensis | SOMBRERO - QuickGerm® |



S 310 Sportrasen – Neuanlage, RSM 3.1

- JULIWA-HESA-Qualität 7,4 (RSM-Mindestanforderung 6,7)
- **für Sportanlagen nach DIN 18035/4**
und andere strapazierte Flächen
- die besten Sorten für hohe Narbendichte
- Verwendung von Sorten mit guter genetischer Qualität
- je nach Nutzung mittlere bis hohe Pflegeansprüche

Empfohlene Ansaatmenge: ca. 25 g/m²

- **10 kg** ausreichend für ca. **400 m²**

Zusammensetzung

| | | |
|--------|----------------|------------|
| 20,0 % | Lolium perenne | JUBILEE EG |
| 30,0 % | Lolium perenne | ROKADE |
| 15,0 % | Poa pratensis | ANISHA |
| 25,0 % | Poa pratensis | MIRACLE |
| 10,0 % | Poa pratensis | ZEPTOR |

S 311 Sportrasen – TURBO, RSM 3.1

- JULIWA-HESA-Qualität 7,8 (RSM-Mindestanforderung 7,6)
- Ab 2023 ermöglicht die RSM einen höheren Anteil an Lolium perenne (bis 70 %), dabei müssen 20 % die Strapazierrasennote "9" aufweisen (hier COLETTA)
- besonders schnelle Anfangsentwicklung

Empfohlene Ansaatmenge: ca. 25 g/m²

- **10 kg** ausreichend für ca. **400 m²**

Zusammensetzung

| | | |
|--------|----------------|------------|
| 20,0 % | Lolium perenne | COLETTA |
| 30,0 % | Lolium perenne | JUBILEE EG |
| 20,0 % | Lolium perenne | ROKADE |
| 15,0 % | Poa pratensis | ANISHA |
| 10,0 % | Poa pratensis | MIRACLE |
| 5,0 % | Poa pratensis | ZEPTOR |

3103 Rustica

- **speziell für belastete und trockenheitsgefährdete Flächen**
- insbesondere für Pferderennbahnen, Polo- und Bolzplätze
- tiefgründige Wurzel Ausbildung, daher auch in Trockenphasen lange grün
- durch das stabile Wurzelwerk gut scherfest
- breitblättriger Aspekt

Empfohlene Ansaatmenge: ca. 35 g/m²

- **10 kg** ausreichend für ca. **250-300 m²**

Zusammensetzung

| | | |
|--------|---------------------|-----------|
| 55,0 % | Festuca arundinacea | AMARELLO |
| 30,0 % | Festuca arundinacea | DEBUSSY 1 |
| 10,0 % | Poa pratensis | MIRACLE |
| 5,0 % | Poa pratensis | ZEPTOR |



Sport

Unsere bekannte Mischung **3102 - Juventus Sportrasen** - wurde mit der Mischung JH 28 - Sport-/Sprinterrasen zusammengeführt, da die Zusammensetzungen identisch sind.

Sie finden diese Mischung unter dem Namen JH 28 - Juventus Sprinterrasen - auf Seite 78.

S 320 Sportrasen – Regeneration, RSM 3.2

- JULIWA-HESA-Qualität 8,0 (RSM-Mindestanforderung 7,7)
- **100 % Lolium perenne**
- schnelle Regeneration auch in kurzen Spielpausen
- hochwertige Lolium-Sorten
- hohe Reinheit und Keimfähigkeit
- für die regelmäßige Nachsaat in stark beanspruchten Bereichen

Empfohlene Nachsaatmenge: ca. 30 g/m²

- **10 kg** ausreichend für ca. **330 m²**

Zusammensetzung

| | | |
|--------|----------------|------------|
| 30,0 % | Lolium perenne | DOUBLE |
| 30,0 % | Lolium perenne | ESQUIRE |
| 20,0 % | Lolium perenne | JUBILEE EG |
| 20,0 % | Lolium perenne | ROKADE |

S 321 Sportrasen – Regeneration, RSM 3.2

mit *Poa pratensis*

- JULIWA-HESA-Qualität 7,8 (RSM-Mindestanforderung 7,5)
- **mit 10 % Poa pratensis**
- für die Regeneration aller beanspruchten Rasenflächen
- Erhaltung der Wiesenrispe im Bestand
- besonders geeignet für die Sommerregeneration
- auch für Abschläge oder stark strapazierte Hausrasenflächen geeignet

Empfohlene Nachsaatmenge: ca. 30 g/m²

- **10 kg** ausreichend für ca. **330 m²**

Zusammensetzung

| | | |
|--------|----------------|----------|
| 35,0 % | Lolium perenne | DOUBLE |
| 30,0 % | Lolium perenne | ESQUIRE |
| 25,0 % | Lolium perenne | TURFGOLD |
| 10,0 % | Poa pratensis | MIRACLE |

S 322 Regenerationsrasen BlueVital NEU!

- JULIWA-HESA-Qualität 8,0 (RSM-Mindestanforderung 7,5)
- mit **Poa pratensis BlueVital**
- schnellere Keimung durch Anregung der Enzymaktivität
- bessere Entwicklung der Keimpflanze und schnelleres Wachstum
- deutlich stärkeres Wurzelwachstum

Empfohlene Nachsaatmenge: ca. 30 g/m²

- **10 kg** ausreichend für ca. **330 m²**

Zusammensetzung

| | | |
|--------|----------------|-------------------|
| 30,0 % | Lolium perenne | DOUBLE |
| 25,0 % | Lolium perenne | GILDARA |
| 30,0 % | Lolium perenne | ROKADE |
| 5,0 % | Poa pratensis | ANISHA BlueVital |
| 10,0 % | Poa pratensis | MIRACLE BlueVital |

BlueVital-Filmcoating

Ausgewählte Poa pratensis Sorten erhalten einen gleichmäßigen, dünnen Film einer Premium Düngelösung und werden dann wieder zurückgetrocknet. Um die Bedingungen gegenüber Weidelgras zu verbessern, wird nur die Wiesenrispe behandelt. Im Gegensatz zu einigen anderen Ummantelungen ist dies mit keiner Erhöhung des Gewichtes verbunden. Die Behandlung ist erkennbar an einer leicht bläulichen Einfärbung.

S 323 Sportrasen EXTRA Regeneration, RSM 3.2

- JULIWA-HESA-Qualität 8,9 (RSM-Mindestanforderung 7,5)
- mit **Poa pratensis QuickGerm®**
- einzigartiges Verfahren zur Reduzierung der Keimdauer der Wiesenrispe
- besonders guter Effekt bei schlechten Keimbedingungen
- Verwendung von Spitzensorten mit höchsten RSM-Bewertungen
- unsere Empfehlung für den anspruchsvollen Nutzer

Empfohlene Nachsaatmenge: ca. 30 g/m²

- **10 kg** ausreichend für ca. **330 m²**

Zusammensetzung

| | | |
|--------|----------------|---------------------|
| 35,0 % | Lolium perenne | COLETTA |
| 15,0 % | Lolium perenne | DICKENS 1 |
| 35,0 % | Lolium perenne | OASE |
| 5,0 % | Poa pratensis | JULIUS - QuickGerm® |
| 10,0 % | Poa pratensis | YVETTE - QuickGerm® |

QuickGerm®

Durch eine kontrollierte Vorkeimung mit Hilfe von Feuchtigkeit und Temperatur werden erste enzymatische Prozesse der Keimung eingeleitet.

Diese werden zu einem genau ermittelten Zeitpunkt durch Trocknung wieder abgebrochen, das Saatgut wird dabei nicht geschädigt und ist lagerfähig wie unbehandeltes Saatgut. Grundsätzlich gilt, dass der Vorsprung der vorgekeimten Wiesenrispe bei schlechteren Wachstumsbedingungen größer ist als bei optimalen Voraussetzungen.

28 Regeneration trockenheitsverträglich

3201 Regenerationsrasen TOP robust

- mit **Festuca arundinacea** für **Flächen ohne Beregnung**
- ideal zur Nachsaat von Flächen, die mit der Mischung „Rustica“ oder „Super-Strap-Rasen“ angesät wurden
- breitblättrige, robuste Gräser
- tiefgründiges Wurzelsystem und daher gute Trockenheitsverträglichkeit

Empfohlene Ansaatmenge: ca. 30 g/m²

- **10 kg** ausreichend für ca. **330 m²**

Zusammensetzung

| | | |
|--------|---------------------|-----------|
| 25,0 % | Festuca arundinacea | AMARELLO |
| 20,0 % | Festuca arundinacea | DEBUSSY 1 |
| 30,0% | Lolium perenne | DOUBLE |
| 25,0 % | Lolium perenne | TURFGOLD |

2305 Regeneration trockenverträglich

- Hitzeverträglich
- Trockenheitsverträglich
- Gute Regenerationsfähigkeit
- Geringe Krankheitsanfälligkeit
- **Geeignet für die Regeneration von Sportrasenplätzen, aber auch für die Neuansaat (z.B. Bolzplätze)**

Empfohlene Nachsaatmenge: ca. 25 g/m²

- **10 kg** ausreichend für ca. **400 m²**

Zusammensetzung

| | | |
|--------|----------------|------------|
| 35,0 % | Lolium perenne | DOUBLE |
| 30,0 % | Lolium perenne | FABIAN |
| 10,0 % | Lolium perenne | TETRAMAGIC |
| 10,0 % | Poa pratensis | ZEPTOR |
| 15,0 % | Poa pratensis | MIRACLE |

3202 Wintermix Regenerationsrasen

- schnelle Keimung
- COLOSSEUM keimt bereits bei relativ niedrigen Temperaturen und zeigt auch im Winter gutes Wachstum
- DOUBLE zeichnet sich als tetraploides Weidelgras durch sehr geringe Schneeschimmelanfälligkeit aus
- Diese Mischung ist besonders **geeignet für die Winternachsaat auf beheizten Plätzen**

Empfohlene Nachsaatmenge: ca. 30 g/m²

- **10 kg** ausreichend für ca. **330 m²**

Zusammensetzung

| | | |
|--------|----------------|-----------|
| 35,0 % | Lolium perenne | COLOSSEUM |
| 30,0 % | Lolium perenne | DOUBLE |
| 35,0 % | Lolium perenne | FABIAN |

Jetzt mit neuer Zusammensetzung - der Anteil an tetraploiden Sorten wurde erhöht. Lolium perenne FABIAN ist eine sehr gut bewertete RSM-Sorte, die sich besonders durch Feinblättrigkeit auszeichnet.

- rasche Keimung auch bei niedrigeren Temperaturen
- schnelle Jugendentwicklung
- gute Regeneration nach Trockenschäden

SOS Super Over Seeding



- **besonders schnelle Keimung**
- Keimung auch bei niedrigeren Temperaturen
- Verwendung von einjährigem Weidelgras mit sehr guten Raseneigenschaften
- ideal für die Nachsaat von beheizten Plätzen im Winter
- sorgt auch im Winter für ansprechende Optik

Empfohlene Nachsaatmenge: ca. 30 g/m²

- **15 kg** ausreichend für ca. **500 m²**

Zusammensetzung

| | | |
|--------|-----------------------|----------|
| 50,0 % | Lolium perenne | ALTESSE |
| 50,0 % | Lolium westerwoldicum | BARTERRA |

Viele Gründe sprechen für



- bietet schnellen Nachsaaterfolg
- keimt bei niedrigen Bodentemperaturen
- verkürzt die Regenerationszeit
- ermöglicht mehr Spielstunden
- unterdrückt Poa annua
- zeigt eine rasche Wurzelbildung





GOLFRASEN

*Für ein
perfektes Spiel*

| | |
|------------|----------|
| Greens | S. 31-34 |
| Tees | S. 35-36 |
| Fairways | S. 36-38 |
| Semirough | S. 39 |
| Hard-Rough | S. 39 |

CHINOOK NEU

- Sattes Mittelgrün
- Hohe Toleranz gegen Dollarspot und Brown Patch
- Ansprechender Rasenaspekt, gute Narbendichte
- Gute Hitze- und Trockentoleranz
- Zeitiger Wachstumsstart im Frühjahr

- **Verpackungseinheit 11,35 kg**

CRYSTAL BLUE LINKS

- dunkle Farbe und exzellente Winterfarbe
- Gute Toleranz gegenüber Rhizoctonia und Dollarspot
- Extrem gute Wurzelbildung/-tiefgang
- Gute Trockenheits- und Schattentoleranz

- **Verpackungseinheit 11,35 kg**

PENNLINKS II

- Helle Farbe, rasches Ergrünen im Frühjahr
- Sehr gute Dollarspot- Toleranz
- Sehr gute Hitze- und Trockenheitsverträglichkeit
- Mittlere Triebdichte mit geringem Pflegeaufwand

- **Verpackungseinheit 11,35 kg**

COBRA NOVA

- Mäßig dunkle Farbe
- Gute Toleranz gegenüber vielen Pilzkrankungen
- Sehr feines Blatt
- Hohe Narbendichte und Rasenqualität

- **Verpackungseinheit 11,35 kg**

INDEPENDENCE I

- Einzige in der RSM gelistete Sorte
- Tiefschnitteignung Note „9“
- Beste Narbendichte und Allgemeinaspekt in der STRI (UK)
- Hervorragende Widerstandsfähigkeit gegenüber Anthraknose
- Sehr geringe Neigung zu Filzbildung

- **Verpackungseinheit 11,35 kg**

PRESTIGE Premium Blend

- Blend aus 2 Spitzensorten:
Pure Distinction und Pure Select
- mittlere Farbe und gute Winterfarbe
- Gute Toleranz gegenüber Dollarspot und Rhizoctonia
- Mittelfeines Blatt

- **Verpackungseinheit 11,35 kg**



BARKING (RSM-Sorte)

- Leuchtend grüne Farbe, hervorragende Winterfarbe
- Geringe Krankheitsanfälligkeit
- Extrem gute Winterhärte und Kältetoleranz
- Hohe Triebdichte mit feiner Blattstruktur

■ **Verpackungseinheit 25 kg**

JORVIK (RSM-Sorte)

- Mittelgrüne Farbe-ganzjährig
- Beste Noten im Tiefschnittversuch in der RSM 2023
- Gute Widerstandsfähigkeit gegen Rotspitzigkeit und Rost
- Mittelfeines Blatt
- Langsamer Wuchs – guter Partner für Festuca

■ **Verpackungseinheit 25 kg**

TEETOP **NEU**

- Hellere Farbe bei guter Winterfärbung
- Gute Tiefschnittverträglichkeit und Krankheitstoleranz
- Feinblättrig und hohe Triebdichte
- Winterhart und kältetolerant

Verpackungseinheit 25 kg



GO 412 Green Standard, RSM 4.1.2

- JULIWA-HESA-Qualität 8,6 (RSM-Mindestanforderung 7,9)
- Agrostis stolonifera mit Festuca-Arten
- **die Mischung für alle Standorteigenschaften**
- Festuca rubra kann krankheitsbedingte Fehlstellen füllen
- Etablierung von Poa annua wird gemindert
- es entsteht mit der Zeit ein Agrostis-dominanter Bestand

Empfohlene Ansaatmenge: ca. 20 g/m²

- **10 kg** ausreichend für ca. **500 m²**

Zusammensetzung

| | | |
|--------|----------------------------|----------------|
| 15,0 % | Agrostis stolonifera | INDEPENDENCE I |
| 25,0 % | Festuca rubra commutata | MUSICA |
| 20,0 % | Festuca rubra commutata | EUROCARINA |
| 20,0 % | Festuca rubra trichophylla | MIRADOR |
| 20,0 % | Festuca rubra trichophylla | PINAFORÉ |

GO 413 Green Höhenlagen, RSM 4.1.3

- JULIWA-HESA-Qualität 8,3 (RSM-Mindestanforderung 7,9)
- **mit Agrostis capillaris für feuchte, höher gelegene Standorte**
- Schnitthöhe 5-6 mm
- wenig krankheitsanfällig
- geringerer Pflegebedarf aufgrund geringerer Filzbildung

Empfohlene Ansaatmenge: ca. 20 g/m²

- **10 kg** ausreichend für ca. **500 m²**

Zusammensetzung

| | | |
|--------|----------------------------|-------------|
| 15,0 % | Agrostis capillaris | BARKING |
| 20,0 % | Festuca rubra commutata | BARGREEN II |
| 25,0 % | Festuca rubra commutata | MUSICA |
| 20,0 % | Festuca rubra trichophylla | MIRADOR |
| 20,0 % | Festuca rubra trichophylla | PINAFORÉ |



GO 414 Green Festuca, RSM 4.1.4

- JULIWA-HESA-Qualität 8,5 (RSM-Mindestanforderung 8,0)
- **ideal bei niedriger Wasser- und Nährstoffversorgung**
- besonders geeignet für trockene, sandige Standorte
- nicht geeignet für Plätze mit hoher Spielbelastung
- Schnitthöhe nicht unter 5 mm
- mittlerer Pflegeaufwand

Empfohlene Ansaatmenge: ca. 30 g/m²

- **10 kg** ausreichend für ca. **300 m²**

Zusammensetzung

| | | |
|--------|----------------------------|-------------|
| 30,0 % | Festuca rubra commutata | BARGREEN II |
| 20,0 % | Festuca rubra commutata | EUROCARINA |
| 25,0 % | Festuca rubra trichophylla | BORLUNA |
| 25,0 % | Festuca rubra trichophylla | PINAFÖRE |

GO 4105 Greens Nachsaat

- Nachsaatmischung für Ansaaten nach RSM 4.1.2
- für alle Grüns, die Festuca-Arten im Bestand haben
- **hohe Anpassungsfähigkeit an klimatische Gegebenheiten**

Empfohlene Ansaatmenge: ca. 10 g/m²

- **10 kg** ausreichend für ca. **1000 m²**

Zusammensetzung

| | | |
|--------|----------------------------|----------------|
| 10,0 % | Agrostis capillaris | POLANA |
| 5,0 % | Agrostis stolonifera | COBRA NOVA |
| 5,0 % | Agrostis stolonifera | INDEPENDENCE I |
| 20,0 % | Festuca rubra commutata | BARGREEN II |
| 20,0 % | Festuca rubra commutata | GREENMILE |
| 40,0 % | Festuca rubra trichophylla | BORLUNA |

GOLFPROGRAMM

Unser Golfprogramm wurde in den letzten Jahren immer weiter ausgefeilt und erweitert. Wir bieten Ihnen Sorten und Mischungen für jeden Einsatzzweck.

Unsere Leistungen für Sie:

- Agrostis-Blends nach Ihren Wünschen
- breite Palette an Spitzensorten
- Sondermischungen für besondere Anforderungen

GO 430 Tee Standard, RSM 4.3

- JULIWA-HESA-Qualität 8,1 (RSM-Mindestanforderung 7,2)
- **Verwendung tiefschnittverträglicher Lolium- und Poa-Sorten**
- geringer Mähgutanfall
- höchste Bewertungen bei der Strapazierfähigkeit

Empfohlene Ansaatmenge: ca. 25 g/m²

- **10 kg** ausreichend für ca. **400 m²**

Zusammensetzung

| | | |
|--------|----------------------------|------------|
| 20,0 % | Festuca rubra commutata | GREENMILE |
| 10,0 % | Festuca rubra rubra | ROSSINANTE |
| 10,0 % | Festuca rubra trichophylla | PINAFORÉ |
| 30,0 % | Lolium perenne | COLETTA |
| 15,0 % | Poa pratensis | LIMOUSINE |
| 15,0 % | Poa pratensis | SOMBRERO |

GO 4301 Tee Schattenlagen

- schattenverträglich durch Poa supina
- sehr gute Trittsverträglichkeit
- hohe Wasser- und Nährstoffansprüche
- **für alle beschatteten Abschläge**, auch als Nachsaat geeignet

Empfohlene Ansaatmenge: ca. 25 g/m²

- **10 kg** ausreichend für ca. **400 m²**

Zusammensetzung

| | | |
|--------|----------------------------|-------------|
| 15,0 % | Festuca rubra rubra | ROSSINANTE |
| 10,0 % | Festuca rubra trichophylla | BORLUNA |
| 25,0 % | Lolium perenne | EURODIAMOND |
| 25,0 % | Lolium perenne | OASE |
| 10,0 % | Poa pratensis | LIMOUSINE |
| 10,0 % | Poa pratensis | MIRACLE |
| 5,0 % | Poa supina | SUPREME |



GO 4302 Tee Quickspeed

- **erhöhter Anteil an Lolium perenne**
- Verwendung von dunklen Sorten
- schnelle Anfangsentwicklung
- für Neuanlage und Nachsaat geeignet
- Anteil an Festuca rubra sorgt für dichte feinblättrige Narbe

Empfohlene Ansaatmenge: ca. 25 g/m²

- **10 kg** ausreichend für ca. **400 m²**

Zusammensetzung

| | | |
|--------|----------------------------|------------|
| 10,0 % | Festuca rubra rubra | DIPPER |
| 5,0 % | Festuca rubra trichophylla | PINAFORE |
| 30,0 % | Lolium perenne | BARORLANDO |
| 30,0 % | Lolium perenne | DOUBLE |
| 15,0 % | Poa pratensis | YVETTE |
| 10,0 % | Poa pratensis | MIRACLE |

GO 441 Fairway I, RSM 4.4, Var. 1

- JULIWA-HESA-Qualität 7,5 (RSM-Mindestanforderung 7,1)
- schnelle Anfangsentwicklung
- ideal für Hanglagen
- gute Unkrautunterdrückung
- **durch Rotschwingel und Straußgras feiner Gesamtaspekt**

Empfohlene Ansaatmenge: ca. 25 g/m²

- **10 kg** ausreichend für ca. **400 m²**

Zusammensetzung

| | | |
|--------|----------------------------|----------|
| 5,0 % | Agrostis capillaris | HIGHLAND |
| 15,0 % | Festuca rubra rubra | MARLENE |
| 20,0 % | Festuca rubra trichophylla | BORLUNA |
| 15,0 % | Lolium perenne | ESQUIRE |
| 15,0 % | Lolium perenne | TRANSATE |
| 20,0 % | Poa pratensis | MIRACLE |
| 10,0 % | Poa pratensis | ZEPTOR |

Die Fairway-Mischungen
auf dieser Doppelseite
werden auch für das
Vorgrün empfohlen.

GO 442 Fairway II, RSM 4.4, Var. 2

- JULIWA-HESA-Qualität 7,5 (RSM-Mindestanforderung 6,8)
- **langsam wachsend**
- trockenheitsverträglich
- langsame Jugendentwicklung - evtl. vermehrter Unkrautdruck
- idealer Ansaatzeitpunkt Herbst

Empfohlene Ansaatmenge: ca. 25 g/m²

- **10 kg** ausreichend für ca. **400 m²**

Zusammensetzung

| | | |
|--------|----------------------------|---------|
| 25,0 % | Festuca rubra rubra | MARLENE |
| 25,0 % | Festuca rubra trichophylla | BORLUNA |
| 20,0 % | Poa pratensis | YVETTE |
| 30,0 % | Poa pratensis | MIRACLE |

GO 443 Fairway III, RSM 4.4, Var. 3

- JULIWA-HESA-Qualität 7,2 (RSM-Mindestanforderung 6,7)
- für feuchtere Lagen
- ohne Lolium perenne, daher geringeres Wachstum
- **wenig Schnittgutanteil**
- geringe Krankheitsanfälligkeit

Empfohlene Ansaatmenge: ca. 25 g/m²

- **10 kg** ausreichend für ca. **400 m²**

Zusammensetzung

| | | |
|--------|----------------------------|----------|
| 5,0 % | Agrostis capillaris | HIGHLAND |
| 25,0 % | Festuca rubra rubra | DIPPER |
| 25,0 % | Festuca rubra trichophylla | BORLUNA |
| 25,0 % | Poa pratensis | MIRACLE |
| 20,0 % | Poa pratensis | ZEPTOR |



GO 444 Fairway IV, RSM 4.4, Var. 4

- JULIWA-HESA-Qualität 7,5 (RSM-Mindestanforderung 7,2)
- ähnelt der RSM 4.4.1, aber ohne *Agrostis capillaris*
- **auch für die Ansaat im Semirough und für Verbindungswege geeignet**
- sehr schnelle Anfangsentwicklung
- für Hanglagen und bei Unkrautdruck
- auch für die Nachsaat geeignet

Empfohlene Ansaatmenge: ca. 25 g/m²

- **10 kg** ausreichend für ca. **400 m²**

Zusammensetzung

| | | |
|--------|-----------------------------------|-----------|
| 20,0 % | <i>Festuca rubra commutata</i> | GREENMILE |
| 10,0 % | <i>Festuca rubra rubra</i> | DIPPER |
| 10,0 % | <i>Festuca rubra trichophylla</i> | BORLUNA |
| 30,0 % | <i>Lolium perenne</i> | ESQUIRE |
| 30,0 % | <i>Poa pratensis</i> | MIRACLE |

GO 4401 Fairway Nachsaat

- höherer *Lolium perenne*-Anteil als bei einer Neuansaat
- mit *Festuca*-Sorten, um einen vielseitigen Bestand zu halten
- qualitativ hochwertige Sorten
- **gute Konkurrenzkraft in der Nachsaat**

Empfohlene Nachsaatmenge: ca. 20 g/m²

- **10 kg** ausreichend für ca. **500 m²**

Zusammensetzung

| | | |
|--------|-----------------------------------|----------|
| 15,0 % | <i>Festuca rubra rubra</i> | DIPPER |
| 5,0 % | <i>Festuca rubra trichophylla</i> | BORLUNA |
| 30,0 % | <i>Lolium perenne</i> | ESQUIRE |
| 20,0 % | <i>Lolium perenne</i> | TRANSATE |
| 20,0 % | <i>Lolium perenne</i> | TROYA |
| 10,0 % | <i>Poa pratensis</i> | MIRACLE |

GO 450 Semirough Standard, RSM 4.5

- JULIWA-HESA-Qualität 6,8 (RSM-Mindestanforderung 6,6)
- mittlere Belastbarkeit
- langsames Wachstum
- **gute Balltragfähigkeit**
- geringer Mäh Aufwand

Empfohlene Ansaatmenge: ca. 25 g/m²

- **10 kg** ausreichend für ca. **400 m²**

Zusammensetzung

| | | |
|--------|----------------------------|-----------|
| 20,0 % | Festuca rubra commutata | GREENMILE |
| 30,0 % | Festuca rubra rubra | MAXIMA 1 |
| 20,0 % | Festuca rubra trichophylla | BORLUNA |
| 30,0 % | Festuca trachyphylla | HARDTOP |

GO 470 Hard-Rough Festuca

- niedrigwachsende Mischung
- gute Auffindbarkeit des Balles
- **geringer Pflegeaufwand**
- wenig Schnittgut anfall

Empfohlene Ansaatmenge: ca. 10 g/m²

- **10 kg** ausreichend für ca. **1000 m²**

Zusammensetzung

| | | |
|--------|-------------------------|-----------|
| 20,0 % | Festuca rubra commutata | GREENMILE |
| 30,0 % | Festuca rubra rubra | MAXIMA 1 |
| 30,0 % | Festuca trachyphylla | BORNITO |
| 20,0 % | Festuca ovina | BLUES |





PARKPLATZ & DACH

*Mischungen für
spezielle Flächen*

| | |
|--------------------------------|----------|
| Parkplatzrasen RSM | S. 41 |
| Super-Strap-Rasen robust | S. 42 |
| Schotterrasen | S. 43 |
| Parkplatzrasen mit Kräutern | S. 43 |
| Dachbegrünung | S. 44 |
| Sedum | S. 45 |
| Vegetationsmatten /Flachballen | S. 46-47 |

P 510 Parkplatzrasen, RSM 5.1

mit *Achillea millefolium*

- JULIWA-HESA-Qualität 6,9 (RSM-Mindestanforderung 6,1)
- für besonders belastete Flächen
- längere Grünfärbung durch *Achillea millefolium*
- **verträgt auch „Abradieren“ durch Autoreifen**
- *Achillea* besitzt eine tiefgehende Pfahlwurzel, dadurch ist sie trockenheitsverträglich

Empfohlene Ansaatmenge: ca. 25 g/m²

- **10 kg** ausreichend für ca. **400 m²**

Zusammensetzung

| | | |
|--------|-----------------------------------|----------|
| 2,0 % | <i>Achillea millefolium</i> | |
| 15,0 % | <i>Festuca rubra rubra</i> | MAXIMA 1 |
| 5,0 % | <i>Festuca rubra trichophylla</i> | BORLUNA |
| 48,0 % | <i>Lolium perenne</i> | ESQUIRE |
| 20,0 % | <i>Poa pratensis</i> | MIRACLE |
| 10,0 % | <i>Poa pratensis</i> | ZEPTOR |

P 511 Parkplatzrasen, RSM 5.1

- JULIWA-HESA-Qualität 7,0 (RSM-Mindestanforderung 6,2)
- für befestigte Flächen, die dennoch begrünt sein sollen
- ökologisch sinnvolle Alternative zu anderen Verbauungen
- **hält dauerhaft mittlere Befahrung aus**

Empfohlene Ansaatmenge: ca. 25 g/m²

- **10 kg** ausreichend für ca. **400 m²**

Zusammensetzung

| | | |
|--------|-----------------------------------|----------|
| 15,0 % | <i>Festuca rubra rubra</i> | MAXIMA 1 |
| 5,0 % | <i>Festuca rubra trichophylla</i> | PINAFORÉ |
| 20,0 % | <i>Lolium perenne</i> | ESQUIRE |
| 30,0 % | <i>Lolium perenne</i> | TURFGOLD |
| 20,0 % | <i>Poa pratensis</i> | MIRACLE |
| 10,0 % | <i>Poa pratensis</i> | ZEPTOR |

5101 Super-Strap-Rasen robust

- **besonders trockenheitsverträgliche Mischung**
- sehr strapazierfähig
- für Campingplätze, Fahrwege oder Pferderennbahnen geeignet
- robustes, breitblättriges Erscheinungsbild
- sehr tragfähige, dichte Narbe

Empfohlene Ansaatmenge: ca. 35 g/m²

- **10 kg** ausreichend für ca. **280 m²**
- **5 kg** ausreichend für ca. **140 m²**

Zusammensetzung

| | | |
|--------|---------------------|-----------|
| 20,0 % | Festuca arundinacea | AMARELLO |
| 20,0 % | Festuca arundinacea | DEBUSSY 1 |
| 25,0 % | Lolium perenne | DOUBLE |
| 15,0 % | Lolium perenne | TURFGOLD |
| 10,0 % | Poa pratensis | MIRACLE |
| 10,0 % | Poa pratensis | ZEPTOR |



5103 Schotterrasen

- Allroundmischung für befahrbare Rasenflächen
- **ebenso geeignet für Pflasterfugen**
- Achillea millefolium verträgt „Abradieren“ gut
- selbst für verdichtete Böden geeignet

Empfohlene Ansaatmenge: ca. 20 g/m²

- **10 kg** ausreichend für ca. **500 m²**

Zusammensetzung

| | | |
|--------|-------------------------|------------|
| 1,0 % | Achillea millefolium | |
| 15,0 % | Festuca rubra commutata | CHARACTER |
| 12,0 % | Festuca rubra rubra | MAXIMA 1 |
| 35,0 % | Lolium perenne | DOUBLE |
| 25,0 % | Lolium perenne | JUBILEE EG |
| 2,0 % | Poa annua | ANNA |
| 10,0 % | Poa pratensis | MIRACLE |

5104 Parkplatzrasen mit Kräutern

- **Wildrasenaspekt durch Kräuter**
- niedrigwachsend
- benötigt nur extensive Pflege
- 10 % Kräuteranteil

Empfohlene Ansaatmenge: ca. 10 g/m²

- **10 kg** ausreichend für ca. **1000 m²**
- **1 kg** ausreichend für ca. **100 m²**

Zusammensetzung

| | | |
|--------|----------------------------|----------|
| 15,0 % | Festuca rubra trichophylla | PINAFORE |
| 20,0 % | Lolium perenne | ESQUIRE |
| 15,0 % | Lolium perenne | TROYA |
| 10,0 % | Poa annua | ANNA |
| 30,0 % | Poa pratensis | MIRACLE |
| 0,5 % | Achillea millefolium | |
| 0,1 % | Bellis perennis | |
| 0,3 % | Helianthemum nummularium | |
| 0,3 % | Linaria vulgaris | |
| 1,9 % | Pimpinella saxifraga | |
| 1,0 % | Plantago media | |
| 0,3 % | Potentilla recta | |
| 0,7 % | Prunella vulgaris | |
| 1,4 % | Ranunculus repens | |
| 2,4 % | Sanguisorba minor | |
| 0,3 % | Thymus pulegioides | |
| 0,8 % | Thymus serpyllum | |



D 610 Extensive Dachbegrünung, RSM 6.1

- **niedrigwachsende Gras-Kräuter-Mischung**
- für Dachflächen mit Substratstärken von 10 – 15 cm
- geringe Pflegeansprüche
- nur ein Säuberungsschnitt / Jahr nötig
- 35 % Kräuteranteil

Empfohlene Ansaatmenge: ca. 5 g/m²

- **1 kg** ausreichend für ca. **200 m²**
- **100 g** ausreichend für ca. **20 m²**

Zusammensetzung

| | | |
|--------|----------------------------|----------|
| 2,0 % | Agrostis capillaris | HIGHLAND |
| 2,0 % | Anthoxanthum odoratum | |
| 15,0 % | Festuca rubra commutata | CALLIOPE |
| 13,0 % | Festuca rubra trichophylla | PINAFORE |
| 20,0 % | Festuca trachyphylla | BORNITO |
| 3,0 % | Poa compressa | REUBENS |
| 10,0 % | Poa pratensis | MIRACLE |
| 1,5 % | Achillea millefolium | |
| 2,0 % | Allium schoenoprasum | |
| 3,0 % | Anthemis tinctoria | |
| 2,0 % | Campanula rotundifolia | |
| 6,0 % | Dianthus carthusianorum | |
| 6,0 % | Dianthus deltoides | |
| 1,0 % | Hieracium pilosella | |
| 2,0 % | Leucanthemum vulgare | |
| 2,0 % | Petrorhagia saxifraga | |
| 3,0 % | Prunella grandiflora | |
| 3,0 % | Prunella vulgaris | |
| 1,5 % | Thymus pulegioides | |
| 2,0 % | Thymus serpyllum | |

6101 Dachgarten-Kräuterrasen

- **preiswerte Alternative mit hoher Leistung**
- für trockene Lagen geeignet
- auch bei geringen Substratstärken
- geringe Pflegeansprüche
- nur ein Säuberungsschnitt / Jahr nötig
- 35 % Kräuteranteil

Empfohlene Ansaatmenge: ca. 5 g/m²

- **1 kg** ausreichend für ca. **200 m²**
- **100 g** ausreichend für ca. **20 m²**

Zusammensetzung

| | | |
|--------|----------------------------|--------------------------|
| 2,0 % | Agrostis capillaris | HIGHLAND |
| 20,0 % | Festuca rubra commutata | CALLIOPE |
| 10,0 % | Festuca rubra trichophylla | BORLUNA |
| 30,0 % | Festuca trachyphylla | BORNITO |
| 3,0 % | Poa compressa | REUBENS |
| 1,8 % | Achillea millefolium | |
| 3,5 % | Anthemis tinctoria | |
| 0,4 % | Aster amellus | |
| 0,4 % | Campanula rotundifolia | |
| 2,1 % | Dianthus carthusianorum | |
| 2,1 % | Dianthus deltoides | |
| 1,4 % | Knautia arvensis | |
| 3,7 % | Leucanthemum vulgare | |
| 0,4 % | Linaria vulgaris | |
| 2,1 % | Linum perenne | |
| 1,8 % | Origanum vulgare | |
| 0,3 % | Petrorhagia saxifraga | |
| 1,7 % | Pimpinella saxifraga | |
| 0,3 % | Prunella grandiflora | |
| 2,1 % | Prunella vulgaris | |
| 2,1 % | Salvia pratensis | 1,0 % Thymus pulegioides |
| 5,2 % | Sanguisorba minor | 1,7 % Thymus serpyllum |
| 0,7 % | Teucrium chamaedrys | 0,2 % Viola tricolor |

434001 Sedum-Sprossen-Mischung

- Enthält mindestens 5-6 Arten
- Jahreszeitliche Schwankungen in der Zusammensetzung
- Verschiedene Blühfarben
- Benötigte Menge: 60-80 g/m²

Sedum-Sprossen Einzelarten

- Für jeden Einsatz die richtige Art
- Einbeziehung von farblichen Aspekten möglich
- Jahreszeitliche Verfügbarkeit muss angefragt werden.
- Benötigte Menge: 60-80 g/m²

Lieferbar von Ende März bis Ende Oktober, je nach Witterung und Verfügbarkeit. Diverse Arten/Sorten, z. B. buntblättrige Sorten, auf Anfrage.

Die Ware ist bei Eingang sofort zu prüfen.

| Artikel Nr. | Botanischer Name | Geselligkeit * | Blütezeit | Blütenfarbe | ca. Höhe in cm |
|-------------|----------------------|----------------|-------------|--------------|----------------|
| 43 40 05 | Sedum acre | 3-4 | Mai-Juni | gelb | 3-6 |
| 43 40 10 | Sedum album | 3-4 | Juni-Juli | weiß | 3-10 |
| 43 40 15 | Sedum album „Murale“ | 3-4 | Juni-Juli | hellrosa | 5-10 |
| 43 40 20 | Sedum reflexum | 2-3 | Juni-Juli | gelb | 3-12 |
| 43 40 40 | Sedum sexangulare | 2-4 | Juni-Juli | gelb | 3-6 |
| 43 40 50 | Sedum ellacombianum | 2-3 | Juni-August | gelb | 5-12 |
| 43 40 80 | Sedum ewersii | 1-3 | August | rosa | 8-15 |
| 43 40 90 | Sedum hybridum | 2-4 | Juli | gelb | 5-12 |
| 43 41 10 | Sedum floriferum | 2-4 | Juni-Juli | goldgelb | 5-12 |
| 43 41 15 | Sedum kamtschaticum | 2-4 | Juli-August | gelb | 5-14 |
| 43 41 20 | Sedum lydium | 2-3 | Juni-Juli | weiß-rosa | 3-5 |
| 43 41 60 | Sedum spurium | 2-4 | Juli-August | dkl.rot/weiß | 5-12 |
| 43 41 65 | Sedum telephium | 1-2 | Sept.-Okt. | rosa/rot | 40-60 |

*Geselligkeitsstufen: 1 = einzeln / 2 = kleine Trupps (3-10 St.) / 3 = größere Gruppen (10-20 St.) / 4 = große Kolonien / 5 = großflächig

VMS Vorkultivierte Vegetationsmatte

- Für besonders schnelle Begrünung
- Geeignet für Extremflächen, z. B. stark geneigt
- Verschiedene Sedum-Arten und -Sorten
- Gemischt mit Gräsern und Moosen

Gerne nennen wir Ihnen Preise
frei befahrbarer Baustelle.

Aufbau der Vegetationsmatten

- Untergrund:
Erosionsschutzmatte 100% Kokos, Gewicht ca. 600 g/m², beidseitig mit PP-Netz versteppt.
Die Matte ist wasserdurchlässig und für die Pflanzenwurzeln gut durchwurzelbar.
- Substrat:
ca. 80 %-ig mineralisches Dachgartensubstrat, ca. 1 cm Stärke, in die Matte eingearbeitet
- Vegetation:
Insgesamt ca. 20 verschiedene Sedum-, Kräuter- und Gräserarten, passend zur extensiven Dachbegrünung
- Gesamtgewicht je nach Feuchtigkeitsgehalt und Pflanzenbestand ca. 15-20 kg/m²



434168 Einzelarten als Flachballenpflanzen

- Vorkultivierte Sedum-, Kräuter oder Gräserarten
- Zur artenreichen Begrünung auf Extremstandorten
- Schnelle Etablierung durch großen Wurzelballen
- Weniger austrocknungsgefährdet als Sprossen oder Saatgut
- 50er-Platten - Ballendurchmesser ca. 5cm
- Bedarf: ca. 12 Stk/m²



Vorteile der extensiven Dachbegrünung

Finanzielle Vorteile:

- Geringere Energiekosten aufgrund der Wärmedämmung
- Niedrigere Abwasserkosten
- Lange Lebensdauer ohne Reparaturen

Hinzu kommen die ökologischen Vorteile:

- Pflanzen verbrauchen CO₂ und produzieren Sauerstoff
- Staub wird aus der Luft gefiltert
- Schallschutz durch Substratschicht



In einigen Bundesländern werden Dachbegrünungen direkt oder indirekt steuerlich gefördert.



LANDSCHAFTSRASEN

Erosion vermeiden

| | |
|-------------------------------|-------|
| Landschaftsrasen Standard | S. 49 |
| Landschaftsrasen Trockenlagen | S. 50 |
| Landschaftsrasen Feuchtlagen | S. 51 |
| Landschaftsrasen Halbschatten | S. 52 |
| Extensive Mischungen | S. 53 |
| Haftkleber | S. 54 |
| Erosionsschutz | S. 55 |

L 711 Landschaftsrasen – Standard, RSM 7.1.1

- JULIWA-HESA-Qualität 6,4 (RSM-Mindestanforderung 5,1)
- **für extensiv genutzte Flächen**
- geringe Wasser- und Nährstoffansprüche
- wenig Aufwuchs
- 0 bis max. 3 Schnitte / Jahr

Empfohlene Ansaatmenge: ca. 20 g/m²

- **10 kg** ausreichend für ca. 500 m²

Zusammensetzung

| | | |
|--------|----------------------------|-----------|
| 5,0 % | Agrostis capillaris | HIGHLAND |
| 15,0 % | Festuca rubra commutata | GREENMILE |
| 15,0 % | Festuca rubra rubra | MAXIMA 1 |
| 10,0 % | Festuca rubra trichophylla | PINAFORE |
| 45,0 % | Festuca trachyphylla | BORNITO |
| 5,0 % | Lolium perenne | TROYA |
| 5,0 % | Poa pratensis | MIRACLE |

Hinweis:

Nicht für Begrünungen mit gebietseigenem Saatgut geeignet!

Für diese Begrünungen wird auf das FLL-Regelwerk „Empfehlungen für Begrünungen mit gebietseigenem Saatgut“ verwiesen (siehe Seite 57 – Regio-Saatgut).

Alle Mischungen in diesem Register sind für extensiv genutzte und/oder gepflegte Flächen im öffentlichen und privaten Grün.

L 712 Landschaftsrasen – Standard, RSM 7.1.2

mit 1,7 % Kräutern

- JULIWA-HESA-Qualität 6,1 (RSM-Mindestanforderung 5,0)
- zusätzlicher Blühaspekt in der Vegetationszeit
- **tiefer gehende Wurzeln der Kräuter**
- dadurch verbesserte biologische Verbauung
- guter Erosionsschutz

Empfohlene Ansaatmenge: ca. 20 g/m²

- **10 kg** ausreichend für ca. 500 m²

Zusammensetzung

| | | |
|--------|----------------------------|------------|
| 5,0 % | Agrostis capillaris | HIGHLAND |
| 20,0 % | Festuca rubra commutata | GREENMILE |
| 15,0 % | Festuca rubra rubra | MAXIMA 1 |
| 8,0 % | Festuca rubra trichophylla | PINAFORE |
| 40,3 % | Festuca trachyphylla | BORNITO |
| 5,0 % | Lolium perenne | JUBILEE EG |
| 5,0 % | Poa pratensis | MIRACLE |

| | |
|-------|----------------------|
| 0,2 % | Achillea millefolium |
| 0,2 % | Centaurea jacea |
| 0,1 % | Daucus carota |
| 0,1 % | Galium album |
| 0,1 % | Galium verum |
| 0,1 % | Leontodon species |
| 0,3 % | Leucanthemum vulgare |
| 0,1 % | Pimpinella saxifraga |
| 0,1 % | Plantago lanceolata |
| 0,1 % | Sanguisorba minor |
| 0,2 % | Lotus corniculatus |
| 0,1 % | Medicago lupulina |

L 721 Landschaftsrasen – Trockenlagen, RSM 7.2.1

- JULIWA-HESA-Qualität 6,6 (RSM-Mindestanforderung 5,3)
- **für extensiv genutzte Flächen in Trockenlagen**
- höherer Lolium-Anteil für schnellen Erosionsschutz
- sehr geringe Wasser- und Nährstoffansprüche
- für alkalische Böden geeignet
- 0 bis max. 3 Schnitte / Jahr

Empfohlene Ansaatmenge: ca. 20 g/m²

- **10 kg** ausreichend für ca. **500 m²**

Zusammensetzung

| | | |
|--------|----------------------------|-----------|
| 5,0 % | Festuca rubra commutata | GREENMILE |
| 15,0 % | Festuca rubra rubra | MAXIMA 1 |
| 5,0 % | Festuca rubra trichophylla | PINAFORÉ |
| 60,0 % | Festuca trachyphylla | BORNITO |
| 15,0 % | Lolium perenne | ESQUIRE |



L 722 Landschaftsrasen – Trockenlagen, RSM 7.2.2

mit 3,1 % Kräutern

- JULIWA-HESA-Qualität 6,3 (RSM-Mindestanforderung 5,1)
- **höherer Lolium-Anteil für schnellen Erosionsschutz**
- sehr geringe Wasser- und Nährstoffansprüche
- für alkalische Böden geeignet
- 0 bis max. 3 Schnitte / Jahr

Empfohlene Ansaatmenge: ca. 20 g/m²

- **10 kg** ausreichend für ca. **500 m²**

Zusammensetzung

| | | |
|--------|----------------------------|-----------|
| 5,0 % | Festuca rubra commutata | GREENMILE |
| 5,0 % | Festuca rubra rubra | MAXIMA 1 |
| 10,0 % | Festuca rubra trichophylla | PINAFORÉ |
| 61,9 % | Festuca trachyphylla | BORNITO |
| 15,0 % | Lolium perenne | ESQUIRE |

| | | |
|-------|-------------------------|----------------|
| 0,2 % | Achillea millefolium | |
| 0,1 % | Centaurea jacea | |
| 0,1 % | Centaurea scabiosa | |
| 0,1 % | Daucus carota | |
| 0,2 % | Dianthus carthusianorum | |
| 0,1 % | Galium album | |
| 0,1 % | Galium verum | |
| 0,1 % | Leontodon sp. | |
| 0,2 % | Leucanthemum vulgare | |
| 0,1 % | Pimpinella saxifraga | |
| 0,1 % | Plantago lanceolata | |
| 0,2 % | Salvia pratensis | |
| 0,1 % | Sanguisorba minor | |
| 0,2 % | Anthyllis vulneraria | |
| 0,2 % | Lotus corniculatus | LEO |
| 0,2 % | Medicago lupulina | VIRGO PAJBBERG |
| 0,8 % | Onobrychis vicifolia | |

L 730 Landschaftsrasen – Feuchtlagen, RSM 7.3

- JULIWA-HESA-Qualität 5,8 (RSM-Mindestanforderung 4,8)
- **für staunässegefährdete Lagen**
- auf extensiv genutzten und gepflegten Flächen
- hoher Anteil an Agrostis-Arten

Empfohlene Ansaatmenge: ca. 20 g/m²

- **10 kg** ausreichend für ca. **500 m²**

Zusammensetzung

| | | |
|--------|----------------------------|----------------|
| 5,0 % | Agrostis capillaris | HIGHLAND |
| 5,0 % | Agrostis stolonifera | INDEPENDENCE I |
| 10,0 % | Festuca rubra commutata | CHARACTER |
| 20,0 % | Festuca rubra rubra | MAXIMA 1 |
| 15,0 % | Festuca rubra trichophylla | PINAFORE |
| 25,0 % | Festuca trachyphylla | BORNITO |
| 15,0 % | Lolium perenne | TROYA |
| 5,0 % | Poa trivialis | DASAS |

7301 Sickerrasen

- besonders geeignet für die **Begrünung von Entwässerungsmulden**
- verträgt kurzfristige Überflutungen
- erträgt auch zeitweise Austrocknung
- Ansaat von Flächen im Mulden-Rigolen-System

Empfohlene Ansaatmenge: ca. 20 g/m²

- **10 kg** ausreichend für ca. **500 m²**

Zusammensetzung


| | | |
|--------|-------------------------|------------|
| 2,0 % | Agrostis capillaris | HIGHLAND |
| 1,0 % | Agrostis stolonifera | COBRA NOVA |
| 10,0 % | Festuca rubra commutata | CHARACTER |
| 30,0 % | Festuca rubra rubra | MAXIMA 1 |
| 25,0 % | Festuca trachyphylla | BORNITO |
| 25,0 % | Lolium perenne | ESQUIRE |
| 7,0 % | Poa trivialis | DASAS |

Hinweis:

Nicht für Begrünungen mit gebietseigenem Saatgut geeignet!

Für diese Begrünungen wird auf das FLL-Regelwerk „Empfehlungen für Begrünungen mit gebietseigenem Saatgut“ verwiesen (siehe Seite 57 – Regio-Saatgut).

Alle Mischungen in diesem Register sind für extensiv genutzte und/oder gepflegte Flächen im öffentlichen und privaten Grün.





L 740 Landschaftsrasen – Halbschatten, RSM 7.4

- JULIWA-HESA-Qualität 5,7 (RSM-Mindestanforderung 4,4)
- **schattenverträglich durch *Poa nemoralis***
- für wenig beanspruchte Flächen
- schnelle Etablierung durch ausreichenden *Lolium*-Anteil

Empfohlene Ansaatmenge: ca. 20 g/m²

- **10 kg** ausreichend für ca. **500 m²**

Zusammensetzung

| | | |
|--------|-----------------------------------|-----------|
| 5,0 % | <i>Agrostis capillaris</i> | HIGHLAND |
| 10,0 % | <i>Festuca rubra commutata</i> | CHARACTER |
| 15,0 % | <i>Festuca rubra rubra</i> | MAXIMA 1 |
| 10,0 % | <i>Festuca rubra trichophylla</i> | PINAFORE |
| 30,0 % | <i>Festuca trachyphylla</i> | BORNITO |
| 15,0 % | <i>Lolium perenne</i> | TROYA |
| 5,0 % | <i>Poa nemoralis</i> | ENHARY |
| 10,0 % | <i>Poa pratensis</i> | MIRACLE |

Hinweis:

Nicht für Begrünungen mit gebietseigenem Saatgut geeignet!

Für diese Begrünungen wird auf das FLL-Regelwerk „Empfehlungen für Begrünungen mit gebietseigenem Saatgut“ verwiesen (siehe Seite 57 – Regio-Saatgut).

Alle Mischungen in diesem Register sind für extensiv genutzte und/oder gepflegte Flächen im öffentlichen und privaten Grün.

7901 Extensivmischung

- zur Begrünung aller Böden, auch Rohböden
- schnelle und sichere Keimung durch Weidelgras und Kleearten
- schneller Erosionsschutz
- 2 bis 4 Schnitte / Jahr
- Blühaspekt durch Leguminosen

Empfohlene Ansaatmenge: ca. 10 g/m²

- 10 kg ausreichend für ca. 1000 m²

Zusammensetzung

| | | |
|--------|-----------------------|----------|
| 40,0 % | Festuca rubra rubra | MAXIMA 1 |
| 10,0 % | Festuca trachyphylla | BORNITO |
| 40,0 % | Lolium perenne | BELIDA |
| 4,0 % | Onobrychis viciifolia | |
| 2,0 % | Trifolium incarnatum | SIGNAL |
| 1,0 % | Trifolium repens | SW HEBE |
| 3,0 % | Trifolium resupinatum | DS MAGIC |

7902 Untersaat

- hoher Anteil an niedrigwachsenden Leguminosen
- ideal zur Bodendeckung unter Gehölzen
- geringer Arbeitsaufwand (Freischneiden)
- **gute Unkrautunterdrückung**
- keine Nährstoffkonkurrenz, da die Leguminosen Stickstoff binden

Empfohlene Ansaatmenge: ca. 10 g/m²

- 10 kg ausreichend für ca. 1000 m²

Zusammensetzung

| | | |
|--------|------------------------|-------------|
| 45,0 % | Festuca rubra rubra | MAXIMA 1 |
| 15,0 % | Festuca trachyphylla | BORNITO |
| 1,0 % | Lotus corniculatus | BACO |
| 10,0 % | Trifolium alexandrinum | TIM |
| 12,0 % | Trifolium incarnatum | SIGNAL |
| 2,0 % | Trifolium repens | SW HEBE |
| 10,0 % | Trifolium resupinatum | DS MAGIC |
| 5,0 % | Trifolium subterraneum | WOOGENELLUP |

Erosionsschutz mit Naturfasern

Erosionsschutzmatten schützen lose Oberflächenschichten bis zur vollen Durchwurzelung und sichern diese Flächen vor dem Abrutschen.

Sie bewahren Boden, Saat und Keimlinge vor Abtrag durch Wind, Wasser und vor Temperaturschwankungen bei Hitze und Frost.

Die natürlichen Fasern der Matten speichern Feuchtigkeit und geben diese an Boden und Pflanzen weiter.

Die Matten verrotten – je nach Faserart – nach ca. 1 bis 5 Jahren. Während der Verrottung wird dem Boden Humus zugeführt.



Kokosgewebe, darunter angesät

HK 1 Verdyol® super

Eigenschaften von Haftkleber

- Verhindert zuverlässig Winderosion
- Bindet wirkungsvoll und langanhaltend Staubpartikel
- **Ermöglicht Ansaaten auch an steilen Böschungen**
- Auch auf Kleinflächen wirtschaftlich anwendbar
- Fixiert Bodenoberflächen
- Für Erd-Zwischenlager ebenso geeignet wie zur Begrünung steriler Rohböden

Analyse

polymerisierte, organische Kolloide,
wasserlösliches, braunes Pulver

pH-Wert: 7,3

Aufwandmenge: 20 g/m²

Verpackungseinheit 15 kg



Erosionsschutzmatten

| Artikel | Bezeichnung | Beschreibung |
|-------------|--------------------------|--|
| SMP | Stroh-Matte / PP | Beidseitig mit PP vernetzt, mit PP-Faden versteppt |
| SMJ | Stroh-Matte / Jute | Beidseitig mit Jute vernetzt, mit Jute-Faden versteppt |
| SKMP | Stroh-Kokos-Matte / PP | Beidseitig mit PP vernetzt, mit PP-Faden versteppt |
| SKMJ | Stroh-Kokos-Matte / Jute | Beidseitig mit Jute vernetzt, mit Jute-Faden versteppt |
| KMP | Kokos-Matte / PP | Beidseitig mit PP vernetzt, mit PP-Faden versteppt |
| KMJ | Kokos-Matte / Jute | Beidseitig mit Jute vernetzt, mit Jute-Faden versteppt |

Technische Daten:

Rollenmaße 2,40 m x 60 m (120 m²). Abgabe nur in ganzen Rollen

Erosionsschutzgewebe

| Artikel | Bezeichnung | Beschreibung |
|-------------|-------------|--|
| K400 | Kokosgewebe | Lichte Maschenweite ca. 30 x 30 mm, Gewicht ca. 400 g/m ² |
| K700 | Kokosgewebe | Lichte Maschenweite ca. 20 x 20 mm, Gewicht ca. 700 g/m ² |

Technische Daten:

Rollenmaße 2,00 m x 50 m (100 m²). Abgabe nur in ganzen Rollen

| Artikel | Bezeichnung | Beschreibung |
|-------------|-------------------|--|
| J500 | Jutemaschengewebe | Lichte Maschenweite ca. 22 x 22 mm, Gewicht ca. 500 g/m ² |

Technische Daten:

Bahnen in Ballen gepresst, ca. 61 m², alternativ in Rollen á ca. 100 m²

Abweichungen aller Maße um +/- 10 % sind rohstoff- und produktionsbedingt

L-förmige Stahlkrampen

Länge ca. 30 cm

Verpackungseinheit: Karton mit 500 Stück

U-förmige Drahtbügel

Länge ca. 23 cm

Verpackungseinheit: Karton mit 250 Stück



BLUMENWIESEN

*Artenvielfalt
Flora und Fauna*

Regio-Saatgut

S. 57-59

Biotopflächen, RSM 8

S. 60/61

Blumenwiesen

S. 62/63

Bei Begrünungen in der freien Natur besteht nach Bundesnaturschutzgesetz ein Genehmigungsvorbehalt gegen die Verwendung von Pflanzen gebietsfremder Arten (BNatSchG § 40 (4)).

Ziel dieser Vorgabe ist der Schutz vor Florenverfälschung und die Erhaltung der biologischen Vielfalt.

Gebietsfremdes Saatgut ist:

- Saatgut mit unbekannter Herkunft
- Saatgut mit bekannter Herkunft, die nicht dem Ausbringungsort entspricht (abweichendes Ursprungsgebiet)
- Zuchtsortensaatgut
- Saatgut von Neophyten

- Unterteilung von Deutschland in 22 Ursprungsregionen
- mehr Informationen unter www.regionalisierte-pflanzenproduktion.de

| Kennzahl | Ursprungsgebiete |
|----------|--|
| 1 | Nordwestdeutsches Tiefland |
| 2 | Westdeutsches Tiefland mit Unterem Weserbergland |
| 3 | Nordostdeutsches Tiefland |
| 4 | Ostdeutsches Tiefland |
| 5 | Mitteldeutsches Tief- und Hügelland |
| 6 | Oberes Weser- und Leinebergland mit Harz |
| 7 | Rheinisches Bergland |
| 8 | Erz- und Elbsandsteingebirge |
| 9 | Oberheingraben mit Saarpfälzer Bergland |
| 10 | Schwarzwald |
| 11 | Südwestdeutsches Bergland |
| 12 | Fränkisches Hügelland |
| 13 | Schwäbische Alb |
| 14 | Fränkische Alb |
| 15 | Thüringer Wald, Fichtelgebirge und Vogtland |
| 16 | Unterbayrische Hügel- und Plattenregion |
| 17 | Südliches Alpenvorland |
| 18 | Nördliche Kalkalpen |
| 19 | Bayrischer und Oberpfälzer Wald |
| 20 | Sächsisches Löss- und Hügelland |
| 21 | Hessisches Bergland |
| 22 | Uckermark mit Odertal |

Regionenkarte



Biotop



Regio-Saatgut RegioZert®

| Artikel | Bezeichnung | Beschreibung (Ursprungsgebiete siehe Seite 57) | % Gräser / % Kräuter | Reinsaatmenge [g/m ²] |
|---------|--------------------------------------|--|-------------------------|--------------------------------------|
| 9610 | Regio Frischwiese / Grundmischung | klassische Wiese (Glatthaferwiese) für mittlere, mäßig versorgte Standorte ohne extreme Ausprägung mit breitem Standortpektrum; auch zur Anlage von Streuobstwiesen geeignet | 70 / 30 | 3 – 5 |
| 9620 | Regio Sandmagerrasen | niedrigwüchsige Magerwiese für trockene und magere Standorte mit mäßig bis saurem Boden-pH-Wert; auch für Rohböden (karge, steinige Standorte) geeignet | 70 / 30 | 3 – 5 |
| 9630 | Regio Kalkmagerrasen | Magerwiese für wärmebegünstigte, trockene und basen- bzw. kalkreiche Böden (alkalische Boden-pH-Werte); auch für Rohböden (karge, steinige Standorte) geeignet | 70 / 30 | 3 – 5 |
| 9640 | Regio Feuchtwiese / Ufermischung | extensive Wiese für feuchte bis nasse Standorte sowie Gewässerränder; bevorzugt nährstoffreiche Standorte mit Grundwasseranschluss | 70 / 30 | 3 – 5 |
| 9660 | Regio Böschung | spezielle Mischung zur Begrünung von erosionsgefährdeten Lagen; durch ausgeprägte Wurzelhorizonte besonders für Böschungen geeignet; Verwendung vor allem im Straßenbau | 70 / 30 | 5 – 7 |
| 9670 | Regio Böschung | gräserbetonte Mischung zur Begrünung von erosionsgefährdeten Lagen; durch ausgeprägte Wurzelhorizonte und schnelle Entwicklung besonders für Böschungen geeignet; Verwendung vor allem im Straßenbau | 85 / 15 | 5 – 7 |
| 9680 | Regio Feldrain | kräuterreiche Mischung für Blühstreifen und Säume; mit vielen Trachtpflanzen (Insektennahrung) zur artenreichen Begrünung in der Kulturlandschaft | 10 / 90 | 1 – 2 |

- zum Erosionsschutz kann eine Schnellbegrünungskomponente beigemischt werden (z.B. Bromus secalinus);
- die Beigabe von Saathilfe (Sojaschrot, Maisspindelgranulat) erleichtert die Ausbringung;
- die Mischungen 9610 bis 9680 können mit dem Siegel RegioZert® hergestellt werden; (Zertifizierung durch eine unabhängige Kontrollstelle QAL);
- für einige Ursprungsgebiete sind auf Grund der Standortbedingungen nicht alle Mischungen vorgesehen;
- alle Mischungen werden speziell für jeden Auftrag erstellt und variieren in der Zusammensetzung je nach Saatgutverfügbarkeit und Zwischenverkauf.



Regio-Saatgut VWW®

| Artikel | Bezeichnung | Beschreibung (Ursprungsgebiete siehe Seite 57) | % Gräser / % Kräuter | Reinsaatmenge [g/m ²] |
|---------|---|---|-------------------------|--------------------------------------|
| 9460 | Blumenwiese Nr. 1 | extensiv genutzte, sehr artenreiche Blumenwiese mit niedrig- bis hochwüchsigen Arten; bevorzugt für magere Standorte; Akzeptanzarten (Klatschmohn, Kornblume) für Blüte im Ansaatjahr enthalten | 50 / 50 | 3 – 5 |
| 9463 | Frischwiese / Fettwiese Nr. 2 | klassische Glatthaferwiese für frische bis nährstoffreiche Standorte ohne extreme Ausprägung; erreicht vor dem 1. Schnitt eine Höhe von ca. 80-120 cm | 70 / 30 | 3 – 4 |
| 9469 | Böschungen / Straßenbegleitgrün Nr. 3 | Begrünungsmischung für Straßenbau und Flurbereinigung; unterschiedliche Wurzelhorizonte zur Sicherung von erosionsgefährdeten Böschungslagen | 70 / 30 | 4 – 6 |
| 9471 | Salzverträgliche Bankettmischung Nr. 4 | robuste, niedrigwüchsige Begrünungsmischung für Verkehrsrandflächen mit darin enthaltenen salzverträglichen Arten | 80 / 20 | 4 – 6 |
| 9462 | Mager- und Sandrasen Nr. 5 | sehr artenreiche Magerwiese mit niedrigem Aufwuchs für trockene Böden und magerstes Substrat; Pionier- und einjährige Akzeptanzarten für einen Blühaspekt im Ansaatjahr enthalten | 50 / 50 | 3 – 4 |
| 9474 | Feuchtwiese Nr. 6 | Wiese für feuchte und nährstoffreiche Standorte im Auenbereich mit schnittverträglichen Gräsern und Kräutern; die Aufwuchshöhe beträgt vor dem Schnitt ca. 100 cm | 70 / 30 | 2 – 4 |
| 9475 | Ufersaum Nr. 7 | Hochstaudenflur zur Begrünung von sehr extensiv genutzten Flächen im direkten Uferbereich von Gewässern; kann in den Außenbereichen mit Feuchtwiese Nr. 6 kombiniert werden | 50 / 50 | 2 – 3 |
| 9472 | Schmetterlings- und Wildbieniensaum Nr. 8 | Mischung für Säume und Blühstreifen, die ausschließlich aus Wildkräutern besteht; viele, auch hochwüchsige Trachtpflanzen zur artenreichen Begrünung | 0 / 100 | 1 – 2 |



Biotop

- die Beimischung von Schnellbegrünungskomponenten (nicht für Mischung 9472 und nur eingeschränkt für 9475) erhöht den Erosionsschutz (z.B. *Camelina sativa*, *Bromus secalinus*);
- die Beigabe von Saathilfe (Maisschrot, Maisspindelgranulat) erleichtert die Ausbringung;
- die Mischungen 9460 bis 9472 werden nach dem Qualitätsstandard VWW-Regiosaat® zertifiziert (Kontrollstelle ABCert);
- für einige Ursprungsgebiete sind auf Grund schwieriger Rahmenbedingungen nicht alle Mischungen vorgesehen;
- alle Mischungen werden chargenweise erstellt und variieren in der Zusammensetzung je nach Saatgutverfügbarkeit und Zwischenverkauf.

B 811 Biotopflächen, RSM 8.1, Variante 1

- artenreiches Extensivgrünland, Grundmischung
- für Standorte ohne extreme Ausprägung

Empfohlene Ansaatmenge: ca. 3-7 g/m²

- **10 kg** ausreichend für ca. **1500-3300 m²**
- **1 kg** ausreichend für ca. **150-330 m²**

Hinweis: Nicht für Begrünungen mit gebietseigenem Saatgut geeignet! (siehe Seite 57 – Regio-Saatgut)

Zusammensetzung

| | | |
|--------|-------------------------|-------------|
| 5,0 % | Agrostis capillaris | HIGHLAND |
| 5,0 % | Anthoxanthum odoratum | |
| 3,0 % | Briza media | |
| 5,0 % | Bromus sp | |
| 10,0 % | Cynosurus cristatus | |
| 10,0 % | Festuca rubra commutata | SW CYGNUS |
| 10,0 % | Festuca rubra rubra | REVERENT |
| 20,0 % | Festuca trachyphylla | BORNITO |
| 2,0 % | Trisetum flavescens | TRISSETT 51 |
| 30,0 % | Kräuter/Leguminosen | |

Kräuteranteil

| | | |
|-------|------------------------|-----------------------------|
| 0,8 % | Achillea millefolium | |
| 2,0 % | Agrostemma githago | |
| 0,2 % | Campanula patula | |
| 0,2 % | Campanula rotundifolia | |
| 2,0 % | Centaurea cyanus | 0,3 % Lotus corniculatus |
| 1,5 % | Centaurea jacea | 1,5 % Malva moschata |
| 1,0 % | Crepis biennis | 1,5 % Onobrychis viciifolia |
| 1,5 % | Daucus carota | 1,5 % Papaver rhoeas |
| 1,5 % | Galium mollugo | 1,5 % Pimpinella saxifraga |
| 0,5 % | Galium verum | 2,0 % Salvia pratensis |
| 1,5 % | Hypericum perforatum | 2,5 % Sanguisorba minor |
| 1,0 % | Knautia arvensis | 0,5 % Silene flos-cuculi |
| 0,5 % | Leontodon hispidus | 1,0 % Silene vulgaris |
| 1,5 % | Leucanthemum vulgare | 2,0 % Tragopogon pratensis |

B 812 Biotopflächen, RSM 8.1, Variante 2

- ausgeprägte Magerstandorte, mäßig bis stark sauer
- mäßig trockene Flächen

Empfohlene Ansaatmenge: ca. 3-7 g/m²

- **10 kg** ausreichend für ca. **1500-3300 m²**
- **1 kg** ausreichend für ca. **150-330 m²**

Zusammensetzung

| | | |
|--------|-------------------------|-------------|
| 5,0 % | Agrostis capillaris | HIGHLAND |
| 5,0 % | Anthoxanthum odoratum | |
| 3,0 % | Briza media | |
| 5,0 % | Bromus mollis | |
| 5,0 % | Cynosurus cristatus | |
| 15,0 % | Festuca rubra commutata | SW CYGNUS |
| 8,0 % | Festuca rubra rubra | MELLORI |
| 20,0 % | Festuca trachyphylla | BORNITO |
| 2,0 % | Holcus lanatus | |
| 2,0 % | Trisetum flavescens | TRISSETT 51 |
| 30,0 % | Kräuter/Leguminosen | |

Kräuteranteil

| | | |
|-------|------------------------|-----------------------------|
| 0,8 % | Achillea millefolium | |
| 2,0 % | Agrostemma githago | |
| 0,2 % | Campanula rotundifolia | |
| 2,0 % | Centaurea cyanus | |
| 1,5 % | Centaurea jacea | 1,5 % Malva moschata |
| 1,5 % | Daucus carota | 1,5 % Onobrychis viciifolia |
| 1,5 % | Dianthus deltoides | 1,5 % Papaver rhoeas |
| 0,5 % | Galium verum | 1,5 % Pimpinella saxifraga |
| 0,2 % | Hieracium pilosella | 1,0 % Rumex acetosella |
| 1,5 % | Hypericum perforatum | 2,0 % Salvia pratensis |
| 1,0 % | Knautia arvensis | 2,5 % Sanguisorba minor |
| 0,5 % | Leontodon hispidus | 1,0 % Silene vulgaris |
| 1,5 % | Leucanthemum vulgare | 0,5 % Thymus serpyllum |
| 0,3 % | Lotus corniculatus LEO | 2,0 % Tragopogon pratensis |

B 813 Biotopflächen, RSM 8.1, Variante 3

- ausgeprägte Magerstandorte, neutral bis alkalisch, Kalk
- mäßig trockene Flächen

Empfohlene Ansaatmenge: ca. 3-7 g/m²

- **10 kg** ausreichend für ca. **1500-3300 m²**
- **1 kg** ausreichend für ca. **150-330 m²**

B 814 Biotopflächen, RSM 8.1, Variante 4

- Halb- und Teilschattenbereiche
- für wechselfeuchte Lagen geeignet

Empfohlene Ansaatmenge: ca. 3-7 g/m²

- **10 kg** ausreichend für ca. **1500-3300 m²**
- **1 kg** ausreichend für ca. **150-330 m²**

Hinweis: Nicht für Begrünungen mit gebietseigenem Saatgut geeignet! (siehe Seite 57 – Regio-Saatgut)

Zusammensetzung

| | | |
|--------|-------------------------|------------|
| 5,0 % | Anthoxanthum odoratum | |
| 2,0 % | Brachypodium pinnatum | |
| 3,0 % | Briza media | |
| 2,0 % | Bromus erectus | |
| 5,0 % | Bromus mollis | |
| 5,0 % | Cynosurus cristatus | |
| 15,0 % | Festuca rubra commutata | SW CYGNUS |
| 15,0 % | Festuca rubra rubra | MELLORI |
| 15,0 % | Festuca trachyphylla | BORNITO |
| 1,0 % | Koeleria pyramidata | |
| 2,0 % | Trisetum flavescens | TRISSET 51 |
| 30,0 % | Kräuter/Leguminosen | |

Kräuteranteil

| | | |
|-------|-------------------------|-----------------------------|
| 0,8 % | Achillea millefolium | |
| 2,0 % | Agrostemma githago | |
| 0,2 % | Campanula glomerata | |
| 2,0 % | Centaurea cyanus | 1,5 % Malva moschata |
| 1,5 % | Centaurea scabiosa | 1,5 % Onobrychis viciifolia |
| 1,5 % | Daucus carota | 1,0 % Origanum vulgare |
| 1,5 % | Dianthus carthusianorum | 1,5 % Papaver rhoeas |
| 0,5 % | Galium verum | 1,5 % Pimpinella saxifraga |
| 1,5 % | Hypericum perforatum | 2,0 % Salvia pratensis |
| 1,0 % | Knautia arvensis | 2,5 % Sanguisorba minor |
| 0,5 % | Leontodon hispidus | 1,0 % Silene vulgaris |
| 1,5 % | Leucanthemum vulgare | 0,7 % Thymus pulegioides |
| 0,3 % | Lotus corniculatus | 2,0 % Tragopogon pratensis |

Zusammensetzung

| | | |
|--------|-------------------------|-----------|
| 5,0 % | Agrostis capillaris | HIGHLAND |
| 5,0 % | Anthoxanthum odoratum | |
| 5,0 % | Bromus mollis | |
| 5,0 % | Cynosurus cristatus | |
| 15,0 % | Festuca rubra commutata | SW CYGNUS |
| 10,0 % | Festuca rubra rubra | MELLORI |
| 20,0 % | Festuca trachyphylla | BORNITO |
| 3,0 % | Poa nemoralis | ENHARY |
| 2,0 % | Poa trivialis | DASAS |
| 30,0 % | Kräuter / Leguminosen | |

Kräuteranteil

| | | |
|-------|----------------------|----------------------------|
| 0,8 % | Achillea millefolium | |
| 1,0 % | Agrimonia eupatoria | |
| 2,0 % | Agrostemma githago | 0,3 % Lotus corniculatus |
| 0,2 % | Ajuga reptans | 1,5 % Malva moschata |
| 0,2 % | Campanula patula | 1,5 % Papaver rhoeas |
| 2,0 % | Centaurea cyanus | 1,5 % Pimpinella saxifraga |
| 1,5 % | Centaurea jacea | 1,5 % Prunella vulgaris |
| 1,0 % | Crepis biennis | 2,0 % Salvia pratensis |
| 1,5 % | Galium mollugo | 2,5 % Sanguisorba minor |
| 0,5 % | Galium verum | 1,0 % Silene dioica |
| 1,5 % | Hypericum perforatum | 0,5 % Silene flos-cuculi |
| 1,0 % | Knautia arvensis | 1,0 % Silene vulgaris |
| 1,5 % | Leucanthemum vulgare | 2,0 % Tragopogon pratensis |



9010 Blumenwiese für alle Böden

90 % Gräser
10 % Kräuter

- einjährige Arten sorgen für einen Blühaspekt schon im 1. Jahr
- die Entwicklung benötigt manchmal mehrere Jahre
- Resultat ist ein abwechslungsreicher Blühaspekt
- ideal sind 2-3 Schnitte / Jahr
- das Schnittgut muss unbedingt abgefahren werden

Empfohlene Ansaatmenge: ca. 10 g/m²

- 10 kg ausreichend für ca. 1000 m²
- 5 kg ausreichend für ca. 500 m²

9020 Blumen-/Kräuter-Nachsaatmischung

- ist mit 10 % in der Mischung 9010 enthalten
- die reine Kräutermischung für die Nachsaat
- zur erfolgreichen Nachsaat muss der Bestand lückig sein
- nicht geeignet zur Nachsaat in dichten Rasenflächen

Empfohlene Ansaatmenge: ca. 1-2 g/m²

- 1 kg ausreichend für ca. 500-1000 m²
- 100 g ausreichend für ca. 50-100 m²

Hinweis: Nicht für Begrünungen mit gebietseigenem Saatgut geeignet! (siehe Seite 57 – Regio-Saatgut)

Zusammensetzung

| | | |
|--------|-------------------------|-------------|
| 2,0 % | Arrhenatherum elatius | ARONE |
| 5,0 % | Deschampsia caespitosa | BARCAMPسيا |
| 5,0 % | Festuca pratensis | PASJA |
| 5,0 % | Festuca rubra commutata | GREENMILE |
| 18,0 % | Festuca rubra rubra | MAXIMA 1 |
| 30,0 % | Festuca trachyphylla | BORNITO |
| 2,0 % | Koeleria macrantha | BARKOEL |
| 5,0 % | Phleum pratense | ALMA |
| 5,0 % | Poa nemoralis | ENHARY |
| 10,0 % | Poa pratensis | BALIN |
| 2,0 % | Poa trivialis | DASAS |
| 1,0 % | Trisetum flavescens | TRISSETT 51 |

10,0 % Blumen und Kräuter
Zusammensetzung s. 9020



Zusammensetzung

| | | | |
|-------|-------------------------|-------|----------------------------|
| 4,5 % | Achillea millefolium | | |
| 3,0 % | Anthemis tinctoria | | |
| 2,0 % | Anthyllis vulneraria | | |
| 0,1 % | Campanula glomerata | 6,0 % | Linum perenne |
| 0,1 % | Campanula rotundifolia | 3,0 % | Lotus corniculatus |
| 9,0 % | Carum carvi | 1,0 % | Lotus pendunculatus |
| 5,0 % | Centaurea cyanus | 1,0 % | Lychnis flos cuculi |
| 2,0 % | Centaurea jacea | 0,1 % | Lythrum salicaria |
| 0,5 % | Centaurea scabiosa | 1,0 % | Malva moschata |
| 3,0 % | Cichorium intybus | 6,0 % | Onobrychis viciifolia |
| 1,5 % | Crepis biennis | 0,2 % | Origanum vulgare |
| 2,5 % | Daucus carota | 3,0 % | Papaver rhoeas |
| 1,5 % | Dianthus | 0,5 % | Pimpinella saxifraga |
| | carthusianorum | 2,0 % | Plantago lanceolata |
| 1,0 % | Dianthus deltoides | 1,5 % | Prunella vulgaris |
| 3,0 % | Echium vulgare | 0,5 % | Ranunculus acris |
| 0,5 % | Filipendula ulmaria | 0,5 % | Rumex acetosa |
| 4,0 % | Gallium mollugo | 3,0 % | Salvia pratensis |
| 4,3 % | Gallium verum | 6,0 % | Sanguisorba minor |
| 0,1 % | Geranium pratense | 0,1 % | Sanguisorba officinalis |
| 3,0 % | Hypericum perforatum | 2,8 % | Silene latifolia ssp. alba |
| 0,3 % | Leontodon hispidus | 2,5 % | Silene dioica |
| 6,0 % | Leucanthemum ircutianum | 1,7 % | Silene vulgaris |
| 0,4 % | Linaria vulgaris | 0,5 % | Tragopogon pratensis |

9090 Blumenwiese Kelly®

72,8 % Gräser
27,2 % Kräuter

- hoher Blumen- und Kräuteranteil
- **auch für frische / feuchte Standorte geeignet**
- sollte nicht für Futterzwecke genutzt werden
- zwei bis drei Schnitte / Jahr
- das Schnittgut muss unbedingt abgefahren werden

Empfohlene Ansaatmenge: ca. 5 g/m²

- **10 kg** ausreichend für ca. **2000 m²**
- **1 kg** ausreichend für ca. **200 m²**

9401 Blumenwiese mit Saathilfe

50 % Gräser
50 % Kräuter

- Ansaatmenge 25 g/m², ca. 5 g Saatgut und 20 g Saathilfe
- **sehr hoher Kräuteranteil**
- mit einjährigen Arten für den Blühaspekt im 1. Jahr
- ist einer natürlichen blütenreichen Wiese nachempfunden
- ein bis zwei Schnitte / Jahr
- das Schnittgut muss unbedingt abgefahren werden

Empfohlene Ansaatmenge (mit Saathilfe): ca. 25 g/m²

- **10 kg** ausreichend für ca. **400 m²**
- **1 kg** ausreichend für ca. **40 m²**

Hinweis: Nicht für Begrünungen mit gebietseigenem Saatgut geeignet! (siehe Seite 57 – Regio-Saatgut)

Zusammensetzung

| | | |
|--------|--------------------------------|----------|
| 2,0 % | Agrostis capillaris | HIGHLAND |
| 3,0 % | Anthoxanthum odoratum | |
| 35,0 % | Festuca rubra commutata | KASLLE |
| 17,5 % | Festuca trachyphylla | BORNITO |
| 3,0 % | Poa nemoralis | ENHARY |
| 10,1 % | Poa pratensis | MIRACLE |
| 2,2 % | Trisetum flavescens | HORAL |
| 27,2 % | Blumen, Kräuter u. Leguminosen | |

Blumen- und Kräuteranteil

Achillea millefolium, Anthemis tinctora, Anthyllis vulneraria, Aquilegia vulgaris, Bellis perennis, Caltha palustris, Carum carvi, Centaurea jacea, Centaurea scabiosa, Cichorium intybus, Crepis biennis, Daucus carota, Dianthus carthusianorum, Dianthus deltoides, Knautia arvensis, Leucanthemum ircutianum, Linaria vulgaris, Lotus corniculatus MARIANNE, Lychnis flos cuculi, Plantago lanceolata DIVERSITY, Thymus pulegioides



Zusammensetzung

50 % Gräser: Agrostis capillaris, Anthoxanthum odoratum, Briza media, Bromus erectus, Bromus secalinus, Cynosurus cristatus, Festuca trachyphylla, Festuca pratensis, Festuca rubra rubra, Poa pratensis, Trisetum flavescens

50 % Kräuter: Achillea millefolium, Anthemis tinctoria, Anthriscus sylvestris, Betonica officinalis, Campanula rotundifolia, Carum carvi, Centaurea cyanus, Centaurea jacea, Centaurea scabiosa, Clinopodium vulgare, Crepis biennis, Daucus carota, Dianthus carthusianorum, Dianthus deltoides, Echium vulgare, Galium album, Galium verum, Hypericum perforatum, Hypochaeris radicata, Knautia arvensis, Leontodon hispidus, Leucanthemum ircutianum, Lotus corniculatus, Lychnis-flos-cuculi, Malva moschata, Medicago lupulina, Origanum vulgare, Papaver rhoeas, Pimpinella saxifraga, Plantago lanceolata, Prunella vulgaris, Ranunculus acris, Salvia pratensis, Sanguisorba minor, Silene alba, Silene dioica, Silene noctiflora, Silene vulgaris, Stellaria graminea, Thymus pulegioides, Tragopogon pratensis



Biotop



LA FLEUR BLÜHMISCHUNGEN

*Sinfonie der
Farben*

| | |
|-------------------------------|----------|
| Veitshöchheimer Bienenweide | S. 67 |
| Sommerzauber – Pflückmischung | S. 67 |
| Einjährige Mischungen | S. 68-71 |
| Überjährige Mischungen | S. 72-75 |

Bunte Alternativen zu Pflanzungen

Die Blumenwiese stellt einen schönen Kontrast zum klassischen Rasen in Grünanlagen und auf schwer zugänglichen Flächen dar. Diese Art der Landschaftsgestaltung erfordert wenig Pflege und die Flächen bleiben auch bei Trockenheit bzw. starker Sommerhitze in Blüte. Blümmischungen eignen sich für viele Standorte und sorgen für einen optischen Blickfang.

Niedrigwachsende Mischungen sind ideal für Böschungen und steinige Standorte sowie zum Begrünen von Verkehrsinseln, mittelwüchsige Mischungen für mittelgroße Flächen oder Straßenränder, höher wachsende Pflanzen für ausgedehnte Grünflächen an Stadträndern.



Bodenvorbereitung

Die Vorbereitung wird wie bei einer Rasenanlage durchgeführt. Der Boden sollte ca. 15-20 cm tief bearbeitet und gelockert werden, z. B. durch Fräsen. Handelt es sich um bestehende Rasenflächen, muss der Rasen abgeschält und entfernt werden, alternativ kann er durch den Einsatz einer Umkehrfräse „eingearbeitet“ werden. Wurzelreste, Steine u. ä. werden entfernt. Eine frühzeitige Herstellung der Feinplanie gibt bodenbürtigen Samen die Möglichkeit, zu keimen. Die auflaufenden Pflanzen können dann vor der Aussaat nochmals mechanisch bekämpft werden.

Bei der endgültigen Herstellung des Feinplanums muss ein feinkrümeliges und unkrautfreies Saatbett entstehen.



La Fleur

Ansaat

Die Ansaat erfolgt im Frühjahr, wenn nicht mehr mit Frost gerechnet werden muss. Dies liegt je nach Standort und Witterung zwischen Mitte April und Mitte Mai, auch spätere Ansaaten bis ca. Mitte Juni, sind möglich. Dann kann allerdings in heißen, trockenen Phasen auflaufende Hirse zum Problem werden.

In den meisten Fällen genügt eine Ansaatmenge von 3-6 g/m². Wenn nicht beregnet werden kann, die Ansaat sehr früh erfolgt, oder bekannt ist, dass ein hoher Unkrautdruck herrscht, sollten die Mengen um 1 bis 2 g erhöht werden. Alle Mischungen sind im Hinblick ihrer Zusammensetzung auf Standfestigkeit, Farbzusammensetzung und Blütezeitpunkte optimiert – aber nur bei sorgfältiger Anlage und der richtigen Saatgutmenge erzielt man den optimalen Erfolg.



Etablierung

Die Anlage und Pflege derartiger Flächen erfordert wesentlich weniger Zeit als herkömmliche Blumenbepflanzungen.

Bei nährstoffarmen Böden hat sich eine Gabe mit langsam wirkendem NPK-Dünger in der Anfangsentwicklung bewährt. Organische Dünger (D8- BUGA® Natur-Rasendünger) sind hier gut geeignet.

Dennoch erweist sich eine gewisse Pflege dieser Flächen besonders bei Unkrautentwicklung als nötig, wobei ein oder zwei manuelle Eingriffe im Laufe der Vegetationsphase genügen, damit die „Beikräuter“ nicht überhand nehmen.

Unsere Angaben zu den Wuchshöhen sind nur Anhaltswerte. Je nach Standort und Nährstoffangebot können sie variieren.

9250 Veitshöchheimer Bienenweide

- hochwüchsige Mischung (bis ca. 120 cm)
- optisch ansprechend mit reichhaltigem Blütenangebot
- wertvoller Lebensraum für Bodenbrüter
- über 40 ein- und mehrjährige blühfreudige Wild- und Kulturpflanzen
- für Brachen, Wegraine, Gärten und Parkanlagen
- **Standzeit: bis zu 5 Jahre**

Empfohlene Ansaatmenge: ca. 1-2 g/m²

- **1 kg** ausreichend für ca. **500-1000 m²**
- **100 g** ausreichend für ca. **50-100 m²**

Einige der enthaltenen Arten:

Borago officinalis
Fagopyron esculentum
Phacelia tanacetifolia
Salvia pratensis
Malva moschata/sylvestris



9300 Sommerzauber Pflückmischung

- hochwüchsige Mischung (bis ca. 150 cm)
- Bauerngarten- und Wildpflanzen
- Blüten für langlebige Sommersträuße
- je nach Standort auch ein **zweites Standjahr möglich**

Empfohlene Ansaatmenge: ca. 1-2 g/m²

- **1 kg** ausreichend für ca. **500-1000 m²**
- **100 g** ausreichend für ca. **50-100 m²**

Einige der enthaltenen Arten:

Calendula officinalis
Helianthus annuus
Malva sylvestris mauritiana
Anthemis tinctoria
Oenothera-Sorten



La Fleur

9310 LaFleur petit Der Bodendecker

- geringe Wuchshöhe (ca. 30-40 cm)
- für steinige oder schwer zugängliche Standorte
- **auch für Verkehrsinseln oder Straßenränder geeignet**
- schnelle Etablierung und lange Blühdauer

Empfohlene Ansaatmenge: ca. 4-5 g/m²

- **1 kg** ausreichend für ca. **200-250 m²**
- **100 g** ausreichend für ca. **20-25 m²**

Einige der enthaltenen Arten:

Godetia grandiflora
Callistephus sinensis
Convolvulus tricolor
Centaurea cyanus
Calendula officinalis
Tagetes patula



9320 LaFleur sec Die Trockene

- mittlere Wuchshöhe (ca. 40-50 cm)
- **weniger Wasserverbrauch** gegenüber den anderen LaFleur – Mischungen
- muss dennoch in der Etablierungsphase feucht gehalten werden
- warme Farben, Vorherrschen von gelben bis roten Tönen

Empfohlene Ansaatmenge: ca. 4-5 g/m²

- **1 kg** ausreichend für ca. **200-250 m²**
- **100 g** ausreichend für ca. **20-25 m²**

Einige der enthaltenen Arten:

Centaurea cyanus
Layia platyglossa
Cosmos bipinnatus
Dimorphotheca sinuata
Eschscholtzia californica
Linum grandiflorum



9330 LaFleur chrono Der Allrounder

- mittlere Wuchshöhe (ca. 50-60 cm)
- **besonders früher Blühbeginn**
- buntes Blütenmeer bis zu den ersten Herbstfrösten
- vielfältige und kontrastreiche Farbe

Empfohlene Ansaatmenge: ca. 4-5 g/m²

- **1 kg** ausreichend für ca. **200-250 m²**
- **100 g** ausreichend für ca. **20-25 m²**

Einige der enthaltenen Arten:

Coreopsis tinctoria
Lobularia maritima
Cosmos bipinnatus
Linum grandiflorum
Phacelia campanularia
Gypsophila elegans



weitere Tipps:

- Blumenwiesen wirken besonders gut als Kontrast zu Rasenflächen
- bereiten Sie Ihre Flächen zeitig vor
- wechseln Sie Flächen bei mehrjährigem Einsatz, auch der Einsatz einer Zwischenbegrünung zur Reduzierung des Unkrautdrucks ist hilfreich
- bei starker Frühsommerhitze können die Mischungen 9310 bis 9330 auch gemäht werden und bilden bei nachfolgendem Regen nochmals eine neue Blütenpracht aus



La Fleur

9345 LaFleur chaleur Warme Töne

- mittlere Wuchshöhe (ca. 50 cm)
- **warme Farbmischung in orange, rot und gelb-Tönen**
- sehr dynamische Komposition
- langer Blühaspekt

Empfohlene Ansaatmenge: ca. 4-6 g/m²

- **1 kg** ausreichend für ca. **170-250 m²**
- **100 g** ausreichend für ca. **17-25 m²**

Einige der enthaltenen Arten:

Calendula officinalis
Cosmos sulphureus
Eschscholtzia californica
Zinnia elegans



9346 LaFleur pastelle Die Sanfte

- mittlere Wuchshöhe (ca. 50 cm)
- **Eine Mischung aus blauen, weißen und rosa Blüten**
- Angenehme Wirkung durch Pastelltöne

Empfohlene Ansaatmenge: ca. 4-6 g/m²

- **1 kg** ausreichend für ca. **170-250 m²**
- **100 g** ausreichend für ca. **17-25 m²**

Einige der enthaltenen Arten:

Ammi majus
Convolvulus tricolor
Centaurea cyanus
Linum grandiflorum
Zinnia elegans



9350 LaFleur miel Die Honigspenderin

- mittlere Wuchshöhe (ca. 60-70 cm)
- besonders geringer Pflegeaufwand
- **Pflanzenauswahl mit dem Ziel, Insekten anzulocken**
- auch für größere Flächen geeignet

Empfohlene Ansaatmenge: ca. 3-5 g/m²

- **1 kg** ausreichend für ca. **200-330 m²**
- **100 g** ausreichend für ca. **20-33 m²**

Einige der enthaltenen Arten:

Cosmos bipinnatus
Centaurea cyanus
Echium Hybrid
Ocimum basilicum



9360 LaFleur mini – Der Zwerg unter den Mischungen

- **extrem geringe Wuchshöhe (ca. 10-25 cm)**
- für Flächen mit geringem Unkrautdruck
- für Bereiche, in denen die Sicht nicht eingeschränkt werden soll
- sehr farbenprächtig und lange blühend

Empfohlene Ansaatmenge: ca. 4-5 g/m²

- **1 kg** ausreichend für ca. **200-250 m²**
- **100 g** ausreichend für ca. **20-25 m²**

Einige der enthaltenen Arten:

Dorotheanthus bellidiformis
Portulaca grandiflora Mischung
Petunia hybrida
Silene pendula



La Fleur

9391 LaFleur Poésie Die Frühlingsblüher

- mittlere Wuchshöhe (ca. 50-70 cm)
- **40 % einjährige, 60 % zweijährige Arten**
- empfohlen für die Herbstsaat
- dadurch früher Blühbeginn im darauf folgenden Frühjahr

Empfohlene Ansaatmenge: ca. 3-5 g/m²

- **1 kg** ausreichend für ca. **200-330 m²**
- **100 g** ausreichend für ca. **20-33 m²**

Einige der enthaltenen Arten:

Eschscholtzia californica
Layia platyglossa
Clarkia elegans
Chrysanthemum carinatum
Nigella damascena



9392 LaFleur Ténor Die Bunte

- mittlere Wuchshöhe (ca. 60-70 cm)
- **50 % einjährige, 50 % zweijährige Arten**
- bei Herbstsaat früher Blühbeginn und lange Blühdauer
- bei Frühljahrsaat 2 Standjahre möglich

Empfohlene Ansaatmenge: ca. 3-5 g/m²

- **1 kg** ausreichend für ca. **200-330 m²**
- **100 g** ausreichend für ca. **20-33 m²**

Einige der enthaltenen Arten:

Agrostemma githago
Coreopsis picta
Gypsophila elegans
Linum perenne
Myosotis alpestris



9393 LaFleur demi Ombre Die Schattenverträgliche

- mittlere Wuchshöhe (ca. 50-80 cm)
- 50 % einjährige, 50 % zweijährige Arten
- für Herbst- oder Frühljahrsaussaat
- **für teilbeschattete Standorte konzipiert**
- ACHTUNG! 4-5 Stunden Sonne/Tag sollten gegeben sein

Empfohlene Ansaatmenge: ca. 3-5 g/m²

- **1 kg** ausreichend für ca. **200-330 m²**
- **100 g** ausreichend für ca. **20-33 m²**

Einige der enthaltenen Arten:

Achillea millefolium
Delphinium consolida
Digitalis purpurea
Lunaria biennis



Vorteile von Herbstansaat:

- geringerer Unkrautdruck im Herbst
- Entwicklung von Blattrosetten, die den Winter überstehen
- früher Blühstart im darauf folgenden Jahr
- lange Blühdauer durch die Kombination von verschiedenen Blühzeitpunkten

Die überjährigen Mischungen können alle im Herbst, ca. Ende September bis Mitte Oktober, angesät werden.

Auch eine Frühljahrsansaat ist möglich. Der Blühstart ist dann später, es ist aber noch ein zweites Standjahr möglich.

Bei LaFleur Poésie hat sich die Herbstsaat am besten bewährt.



9394 LaFleur Extrême Die Flexible

- mittlere Wuchshöhe (ca. 50-60 cm)
- **Die Lösung für schwierige Standorte**
- schattenverträglich
- Aussaatzeitpunkt Frühjahr oder Herbst
- Standzeit 2-3 Jahre möglich

Empfohlene Ansaatmenge: ca. 4-6 g/m²

- **1 kg** ausreichend für ca. **170-250 m²**
- **100 g** ausreichend für ca. **17-25 m²**

Einige der enthaltenen Arten:

Asteracea matricaria
Centaurea cyanus
Myosotis alpestris
Phacelia campanularia
Thlaspi umbellata



9395 LaFleur Naturelle Artenvielfalt

- mittlere Wuchshöhe (ca. 50-80 cm)
- **Nahrungsquelle für Insekten und Rückzugsort für Vögel**
- Tiefgehendes Wurzelsystem fördert die Bodengesundheit
- Stickstoffbindung durch Leguminosen
- Aussaatzeitpunkt Frühjahr oder Herbst
- Standzeit 2-3 Jahre möglich

Empfohlene Ansaatmenge: ca. 4-6 g/m²

- **1 kg** ausreichend für ca. **170-250 m²**
- **100 g** ausreichend für ca. **17-25 m²**

Einige der enthaltenen Arten:

Calendula officinalis
Echium vulgare
Ocimum basilikum
Papaver rhoeas
Lupinus einjährig



9396 LaFleur Universelle Alle Standorte

- geringe Wuchshöhe (ca. 20-40cm)
- **stellt wenig Ansprüche an Bodenverhältnisse**
- empfohlen für die Herbstsaussaat
- Standzeit 3-4 Jahre möglich

Empfohlene Ansaatmenge: ca. 2-5 g/m²

- **1 kg** ausreichend für ca. **200-500 m²**
- **100 g** ausreichend für ca. **20-50 m²**

Einige der enthaltenen Arten:

Coreopsis spp.
Eschscholzia californica
Gaillardia x grandiflora
Rudbeckia hirta
Saponaria ocymoides



9397 LaFleur Rustique Die Robuste

- mittlere Wuchshöhe (ca. 30-50 cm)
- Hohe Widerstandskraft
- **Für trockene Böden geeignet**
- empfohlen für die Herbstsaussaat
- Standzeit 3-4 Jahre möglich

Empfohlene Ansaatmenge: ca. 1-4 g/m²

- **1 kg** ausreichend für ca. **250-1000 m²**
- **100 g** ausreichend für ca. **25-100 m²**

Einige der enthaltenen Arten:

Calendula officinalis
Cheiranthus cheirii
Echinops bannaticus
Papaver rhoeas
Thymus vulgaris



La Fleur



STANDARD LANDWIRTSCHAFT

*Qualität zum
guten Preis*

| | |
|--------------------------------|----------|
| Gebrauchsrasenmischungen | S. 77/78 |
| JUVENTUS Sprinterrasen | S. 78 |
| Schattenrasen | S. 79 |
| Böschungsmischungen | S. 79/80 |
| Kräuterwiese | S. 80 |
| Landwirtschaftliche Mischungen | S. 81-83 |

JH 20 Spiel- und Sportrasen

- für normal belastete Hausgartenflächen
- schnelle Begrünung durch hohen Lolium-Anteil
- auch für öffentliche Flächen geeignet
- mittlerer Pflegeaufwand

Empfohlene Ansaatmenge: ca. 35 g/m²

- 10 kg ausreichend für ca. 280 m²

Zusammensetzung

| | | |
|--------|---------------------|----------|
| 25,0 % | Festuca rubra rubra | MAXIMA 1 |
| 30,0 % | Lolium perenne | ESQUIRE |
| 20,0 % | Lolium perenne | TROYA |
| 15,0 % | Lolium perenne | TURFGOLD |
| 10,0 % | Poa pratensis | MIRACLE |

JH 22 Berliner Tiergartenrasen

- einfache Mischung für Hausgärten und öffentliche Grünanlagen
- schnelle Anfangsentwicklung
- preisgünstige Mischung mit Rasensorten
- gute Unkrautunterdrückung
- geringer bis mittlerer Pflegeaufwand

Empfohlene Ansaatmenge: ca. 35 g/m²

- 10 kg ausreichend für ca. 280 m²

Zusammensetzung

| | | |
|--------|---------------------|----------|
| 25,0 % | Festuca rubra rubra | MAXIMA 1 |
| 30,0 % | Lolium perenne | ESQUIRE |
| 20,0 % | Lolium perenne | TROYA |
| 20,0 % | Lolium perenne | TURFGOLD |
| 5,0 % | Poa pratensis | MIRACLE |



Standard

JH 23 Zier- und Gebrauchsrasen, Parkrasen

- für Hausgartenrasen mit Zierrasencharakter
- **preisgünstige Alternative zur RSM 2.3**
- feinblättrig und dichtnarbig
- Verwendung guter Rasensorten
- weniger Konkurrenzkraft gegen bodenbürtige Unkräuter
- höherer Pflegeaufwand

Empfohlene Ansaatmenge: ca. 35 g/m²

- **10 kg** ausreichend für ca. **280 m²**

Zusammensetzung

| | | |
|--------|---------------------|------------|
| 30,0 % | Festuca rubra rubra | MAXIMA 1 |
| 20,0 % | Lolium perenne | ESQUIRE |
| 20,0 % | Lolium perenne | JUBILEE EG |
| 20,0 % | Lolium perenne | TROYA |
| 10,0 % | Poa pratensis | MIRACLE |

JH 28 JUVENTUS Sprinterrasen

- **für Hausgärten und andere Flächen mit höherer Belastung**
- sehr schnelle Anfangsentwicklung
- es entsteht eine robuste Rasenfläche
- gute Regenerationsfähigkeit sichert Lückenschluss bei Narbenschäden
- Aspekt insgesamt breitblättrig, kein Zierrasencharakter

Empfohlene Ansaatmenge: ca. 35 g/m²

- **10 kg** ausreichend für ca. **280 m²**

Zusammensetzung

| | | |
|--------|---------------------|----------|
| 25,0 % | Festuca rubra rubra | MAXIMA 1 |
| 30,0 % | Lolium perenne | ESQUIRE |
| 30,0 % | Lolium perenne | ROKADE |
| 10,0 % | Poa pratensis | MIRACLE |
| 5,0 % | Poa pratensis | ZEPTOR |



JH 30 Schattenrasen

- **einfache Mischung für beschattete Flächen**
- mäßig belastbar
- mittelschnelle Anfangsentwicklung, mittlere Narbendichte
- Schattenflächen müssen regelmäßig nachgesät werden

Empfohlene Ansaatmenge: ca. 35 g/m²

- **10 kg** ausreichend für ca. **280 m²**

Zusammensetzung

| | | |
|--------|----------------------------|----------|
| 27,0 % | Festuca rubra rubra | MAXIMA 1 |
| 5,0 % | Festuca rubra trichophylla | BORLUNA |
| 35,0 % | Lolium perenne | ESQUIRE |
| 25,0 % | Lolium perenne | TROYA |
| 3,0 % | Poa nemoralis | ENHARY |
| 5,0 % | Poa pratensis | MIRACLE |

JH 31 Böschungsmischung mit Klee

- schnell keimende und wachsende Mischung
- besonders geeignet für extensiv gepflegte Hanglagen
- **tief wurzelnde Kleearten unterstützen den Erosionsschutz**
- verschiedene Blütenfarben des Klees sorgen für einen schönen optischen Aspekt
- Kleearten sammeln Stickstoff, dadurch muss wenig gedüngt werden

Empfohlene Ansaatmenge: ca. 35 g/m²

- **10 kg** ausreichend für ca. **280 m²**

Zusammensetzung

| | | |
|--------|-----------------------|----------|
| 28,0 % | Festuca rubra rubra | MAXIMA 1 |
| 40,0 % | Lolium perenne | BELIDA |
| 20,0 % | Lolium perenne | TEMPRANO |
| 3,0 % | Phleum pratense | ALMA |
| 4,0 % | Onobrychis viciifolia | |
| 3,0 % | Trifolium incarnatum | SIGNAL |
| 1,0 % | Trifolium pratense | ROZETA |
| 1,0 % | Trifolium resupinatum | DS MAGIC |



Standard

JH 32 Böschungsmischung ohne Klee

- die Variante, wenn kein Klee erwünscht ist
- schnell keimende und wachsende Mischung
- **für erosionsgefährdete Hanglagen geeignet**
- gute Unkrautunterdrückung

Empfohlene Ansaatmenge: ca. 40 g/m²

- **10 kg** ausreichend für ca. **250 m²**

Zusammensetzung

| | | |
|--------|---------------------|----------|
| 27,0 % | Festuca rubra rubra | MAXIMA 1 |
| 50,0 % | Lolium perenne | BELIDA |
| 20,0 % | Lolium perenne | TEMPRANO |
| 3,0 % | Phleum pratense | ALMA |

JH 35 Kräuterwiese

- hier wurde auf Lolium perenne verzichtet, damit sich die Kräuter etablieren können
- **durch 10 % Kräuteranteil Wildwiesencharakter**
- langsamere Anfangsentwicklung, aber auch geringerer Aufwuchs
- geeignet zum Mulchen, kann auch 3 – 4 mal geschnitten werden
- fördert durch die Blütenbildung die Fauna

Empfohlene Ansaatmenge: ca. 15 g/m²

- **10 kg** ausreichend für ca. **650 m²**

Zusammensetzung

| | | |
|--------|-------------------------|-----------|
| 15,0 % | Festuca rubra commutata | CHARACTER |
| 30,0 % | Festuca rubra rubra | MAXIMA 1 |
| 35,0 % | Festuca trachyphylla | BORNITO |
| 10,0 % | Phleum pratense | ALMA |
| 0,6 % | Carum carvi | |
| 0,2 % | Centaurea cyanus | |
| 0,7 % | Cichorium intybus | |
| 0,5 % | Daucus carota | |
| 0,3 % | Leucanthemum vulgare | |
| 0,2 % | Linum perenne | |
| 2,0 % | Lotus corniculatus | |
| 0,7 % | Medicago lupulina | |
| 1,9 % | Nigella sativa | |
| 0,7 % | Onobrychis viciifolia | |
| 0,3 % | Papaver rhoeas | |
| 1,9 % | Sanguisorba minor | |

LW 1 Dauerwiese

- geeignet für alle Böden und Lagen
- für normale Wiesennutzung zur Futtergewinnung
- hohe Schmackhaftigkeit, gute Verdaulichkeit
- 2 – 4 Schnitte möglich
- auf ausgewogene Düngung achten, da sonst vermehrt Moos auftritt

Empfohlene Ansaatmenge: ca. 5 g/m²

- 10 kg ausreichend für ca. 2000 m²

Zusammensetzung

| | | |
|--------|------------------------|----------|
| 10,0 % | Wiesenschwingel | VALTERI |
| 23,0 % | Lieschgras | ALMA |
| 10,0 % | Wiesenrispe | LIBLUE |
| 20,0 % | Rotschwingel, auslftr. | GONDOLIN |
| 25,0 % | Dt. Weidelgras, früh | MATHILDE |
| 5,0 % | Knaulgras | AMBA |
| 5,0 % | Weißklee | NEMUNIA |
| 2,0 % | Rotklee | NEMARO |

LW 2 Dauerweide

- geeignet für alle Böden und Lagen
- hohe Schmackhaftigkeit, gute Verdaulichkeit
- **auch geeignet für die Kombination Weide und Mahd**
- für intensive Weidehaltung geeignet

Empfohlene Ansaatmenge: ca. 5 g/m²

- 10 kg ausreichend für ca. 2000 m²

Zusammensetzung

| | | |
|--------|----------------------------|----------------|
| 10,0 % | Wiesenschwingel | VALTERI |
| 15,0 % | Lieschgras | ALMA |
| 10,0 % | Wiesenrispe | LIMAGIE |
| 20,0 % | Dt. Weidelgras, früh | BOCCACIO |
| 15,0 % | Dt. Weidelgras, früh | MATHILDE |
| 20,0 % | Dt. Weidelgras, mittelspät | GRASSLANDS NUI |
| 5,0 % | Knaulgras | AMBA |
| 5,0 % | Weißklee | NEMUNIA |



Standard

LW 3 Wildwiese, mehrjährig

- **Wildäsung für Rot-, Reh- und Niederwild**
- hoher Kleeanteil
- wird auf Grund der Schmackhaftigkeit gerne aufgenommen
- auch zur Nutzung als Schnittwiese geeignet

Empfohlene Ansaatmenge: ca. 5 g/m²

- **10 kg** ausreichend für ca. **2000 m²**

Zusammensetzung

| | | |
|--------|----------------------|-----------------|
| 20,0 % | Lieschgras | ALMA |
| 10,0 % | Wiesenrispe | BALIN |
| 30,0 % | Wiesenschwingel | ARITA |
| 10,0 % | Dt. Weidelgras, früh | BELIDA |
| 15,0 % | Dt. Weidelgras, früh | BURLINA 1 |
| 2,0 % | Esparsette | |
| 1,0 % | Hornschatenkle | LEO |
| 2,0 % | Luzerne | TRIADE |
| 5,0 % | Rotklee | KRYNIA |
| 5,0 % | Weißklee | GRASSLANDS HUJA |

LW 4 Pferdeweide ohne Klee, Fructan-arm

- geringer Lolium-Anteil
- **Zusammensetzung speziell auf Pferdehaltung ausgerichtet**
- evtl. sind Fructane für die gefürchtete Erkrankung Hufrehe verantwortlich
- bitte dennoch beachten: an frostigen, sonnigen Tagen sollten empfindliche Pferde vorbeugend nicht auf die Weide

Empfohlene Ansaatmenge: ca. 5 g/m²

- **10 kg** ausreichend für ca. **2000 m²**

Zusammensetzung

| | | |
|--------|------------------------|----------|
| 15,0 % | Wiesenschwingel | VALTERRI |
| 25,0 % | Lieschgras | ALMA |
| 15,0 % | Wiesenrispe | BALIN |
| 15,0 % | Rotschwingel, auslftr. | GONDOLIN |
| 10,0 % | Deutsches Weidelgras | MATHILDE |
| 20,0 % | Rohrschwingel | NINKOKO |



LW 5 Sommergrün

- **einjährige Leguminosenmischung zur Bodenverbesserung**
- kann auch als Zwischenbegrünung zur Unkrautunterdrückung eingesetzt werden
- auffallend schöner blau-roter Blühaspekt
- dient bei Mulchen und Einarbeitung auch als Gründüngung
- aufgrund der unterschiedlichen Korngrößen muss das Saatgut vor der Aussaat unbedingt erneut durchmischt werden

Empfohlene Ansaatmenge: ca. 15 g/m²

- **10 kg** ausreichend für ca. **650 m²**

Zusammensetzung

| | | |
|--------|--------------------------------|----------|
| 40,0 % | Futtererbsen | ARVIKA |
| 30,0 % | Bitterstoffarme, blaue Lupinen | BOREGINE |
| 5,0 % | Phacelia | NATRA |
| 5,0 % | Inkarnatklee | DIOGENE |
| 10,0 % | Sommerwicke | MAXIVESA |
| 2,0 % | Ramtilkraut | |
| 8,0 % | Lein | KAOLIN |

LW 6 Kräuter-Zusatzmischung

- Zusatzmischung für verschiedene Futtermischungen
- eignet sich besonders als Beigabe zur Pferdeweide
- **dient durch die verwendeten Kräuter als „Pferdeapotheke“**
- auch als Beigabe zur Wildwiese für die Erhöhung der Schmackhaftigkeit einsetzbar

Empfohlene Ansaatmenge: ca. 2 g/m²

- **1 kg** ausreichend für ca. **500 m²**
- **100 g** ausreichend für ca. **50 m²**

Zusammensetzung

| | |
|--------|---------------------|
| 16,0 % | Kümmel |
| 20,0 % | Petersilie, wild |
| 10,0 % | Wegwarte |
| 15,0 % | Gemeiner Fenchel |
| 12,0 % | Kleiner Wiesenknopf |
| 10,0 % | Spitzwegerich |
| 5,0 % | Schafgarbe |
| 5,0 % | Wilde Möhre |
| 5,0 % | Echte Kamille |
| 2,0 % | Gemeines Labkraut |



Standard



DÜNGER mineralisch


*Wir machen aus
Gras Rasen*


Mineralische-Langzeitrasendünger

| | |
|-----------------------------|----------|
| Magic-Programm | S. 88/89 |
| Classic-Programm | S. 90/91 |
| sonstige Dünger | S. 92/93 |
| Hi-Green – Dünger für Grüns | S. 94/95 |
| Eisendünger | S. 95 |

PROGRAMMÜBERSICHT

| Magic-Programm | | N / K - Verhältnis | Nährstoffgehalte NP ₂ O ₅ -K ₂ O(-MgO) | % N umhüllt | Granulierung in mm |
|----------------|-----------------------|-----------------------|--|----------------|-----------------------|
| GMV | Multigreen Multiverdo | 1:3 | 12-0-42 (-2) | | 0,4-1,5 |
| EMP | Magic Printempo | 2:1 | 23-5-11 | 50 | 1,0-1,7 |
| EMS | Magic Somero | 1:1 | 17-2-17 (-3) | 40 | 1,0-1,7 |
| EMA | Magic Autuno | 1:2 | 13-4-20 (-4) | 50 | 1,0-1,7 |

| Classic-Programm  | | N / K - Verhältnis | Nährstoffgehalte NP ₂ O ₅ -K ₂ O(-MgO) | % N umhüllt | Granulierung in mm |
|--|------------------------------|-----------------------|--|----------------|-----------------------|
| GCP | Multigreen Classic Printempo | 2:1 | 24-6-14 (-3) | 50 | 2,2-3,5 |
| GCS | Multigreen Classic Somero | 1:1 | 26-5-20 | 40 | 2,2-3,5 |
| GCA | Multigreen Classic Autuno | 1:2 | 18-0-30 (-3) | 50 | 2,2-3,5 |

| Sonstige Dünger  | | N / K - Verhältnis | Nährstoffgehalte NP ₂ O ₅ -K ₂ O(-MgO) | % N umhüllt | Granulierung in mm |
|---|-----------------------|-----------------------|--|----------------|-----------------------|
| GU | Multigreen Universal | 3:1 | 30-8-8 | 85 | 2,2-3,5 |
| GR | Multigreen Starter | | 23-24-10 | 25 | 2,2-3,5 |
| GN | Multigreen Quickstart | | 42-0-0 | 57 | 2,2-3,5 |
| GS | Turfpower Standard | 3:1 | 30-5-8 (-3) | 40 | 2,2-3,5 |


| Greens-Programm | | N / K - Verhältnis | Nährstoffgehalte NP ₂ O ₅ -K ₂ O(-MgO) | % N umhüllt | Granulierung in mm |
|-----------------|----------------------|-----------------------|--|----------------|-----------------------|
| GHP | Hi-Green Printempo | 2:1 | 22-5-10 (-2) | 53 % MU | 0,4-1,5 |
| GHK | Hi-Green NK | 1:2 | 15-5-25 (-2) | 33 % MU | 0,4-1,5 |
| GHR | Hi-Green Starter | | 16-23-10 (-3) | 31 % MU | 0,4-1,5 |
| FER | Greentec Eisendünger | | 4-0-14+9 Fe | | 1,0-1,5 |

Dünger
mineralisch



-Rasendünger mit Multicote®-Technologie

DAS BEWÄHRTE KONZEPT



Die Freisetzung erfolgt rein temperaturgesteuert, das Resultat ist eine gleichmäßige Nährstoffversorgung der Gräser ohne Stoßwachstum – selbst bei extremen Witterungsbedingungen.

- Kontrollierte Freisetzung von Stickstoff reduziert das Auftreten von *Poa annua*
- Sehr geringe Auswaschungsgefahr von Stickstoff
- Intensive, lang anhaltende Grünfärbung

- Auf den Bedarf der Graspflanzen angepasstes N/K-Verhältnis über die gesamte Vegetationsperiode
- Minimiert Nitratauswaschung durch bedarfsgerechte Nährstofffreisetzung
- Reduziert unnötige Biomasseproduktion und führt somit zu geringerem Arbeitsaufwand und verringerten Kosten für die Schnittgutentsorgung
- Kein Schmieren
- Keine Verbrennungsgefahr
- pH-Wert unabhängig
- Staubfrei



Notwendige Informationen zur Erstellung eines optimalen, bedarfsgerechten Düngeplanes sind:

- Bestand / Nährstoffbedarf der Gräser
- Bodenart / Nährstoffgehalt im Boden
- pH-Wert des Bodens
- Nutzungsart
- Vegetationsdauer

Auf Wunsch bieten wir Ihnen unseren Bodenanalyse-service inkl. Düngeplan an – fragen Sie Ihren zuständigen Außendienstmitarbeiter.


Düngeplan: Sportplatz Classic-Programm

| Zeitraum | Dünger | Analyse | | | | Menge g/m ² | Reinnährstoff in g/m ² | | | |
|---------------------|----------------------------------|---------|-------------------------------|------------------|-----|------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|------------------|-----|
| | | N | P ₂ O ₅ | K ₂ O | MgO | | N | P ₂ O ₅ | K ₂ O | MgO |
| April | Multigreen Classic Printempo 2:1 | 24 - | 6 - | 14 - | 3 | 25,0 | 6,0 | 1,5 | 3,5 | 0,8 |
| Juni | Multigreen Classic Somero 1:1 | 26 - | 5 - | 20 - | 0 | 25,0 | 6,5 | 1,3 | 5,0 | 0,0 |
| Aug. | Multigreen Classic Somero 1:1 | 26 - | 5 - | 20 - | 0 | 25,0 | 6,5 | 1,3 | 5,0 | 0,0 |
| Mitte Okt. | Multigreen Classic Autuno 1:2 | 18 - | 0 - | 30 - | 3 | 25,0 | 4,5 | 0,0 | 7,5 | 0,8 |
| Gesamtmenge: | | | | | | 23,5 | 4,0 | 21,0 | 1,6 | |

Ausbringtechnik

Um Streufehler zu minimieren und eine optimale Verteilung des Düngers zu gewährleisten, empfiehlt sich die Ausbringung mit einem Schleuderstreuer. Für größere Flächen gibt es handgeführte Schleuderstreuer auf Rädern, für kleinere sind tragbare Schleuderstreuer erhältlich. Vorteile der Schleuderstreuer sind die große Arbeitsbreite, die Wendigkeit und die Gleichmäßigkeit bei der Anwendung.

Es empfiehlt sich, die Aufwandmenge zu halbieren und die Fläche in zwei Arbeitsgängen abzustreuen. Dabei nicht kreuzweise arbeiten, sondern bei der zweiten Überfahrt um eine halbe Streubreite versetzt fahren (siehe Skizze). So werden Fehler durch falsche Überlappung oder unkorrekte Streuwageneinstellungen ausgeglichen und der Rasen erhält eine gleichmäßige Grünfärbung.



Dünger mineralisch

GMV Multigreen Multiverdo 12-0-42 (-2)

- **Mit sofortiger Wirkung**
- Besonders für den Einsatz im Frühjahr und Herbst oder vor Turnieren
- Staubfrei, klebt und schmiert nicht
- Kalium liegt als Kaliumnitrat vor
- Wirkungsdauer: ca. 3 Wochen

NK(Mg)-Dünger, 12 + 42 (+2)

| | |
|-------------------------|---|
| 12,0 % N | Gesamtstickstoff 12,0 % N Nitratstickstoff |
| 42,0 % K ₂ O | wasserlösliches Kaliumoxid |
| 2,0 % MgO | wasserlösliches Magnesiumoxid |

| | |
|-----------------|--------------------------|
| Granulierung: | 1,0 – 3,0 mm |
| Aufwandmenge: | 15 – 25 g/m ² |
| N/K-Verhältnis: | 1 : 3 |

EMP Magic Printempo 23-5-11 (-2)

- **50 % des Gesamtstickstoffes sind umhüllt**
- Besonders für die Anwendung im Frühjahr
- Fein granuliert
- Wirkungsdauer: ca. 2-3 Monate

NPK(Mg)-Dünger, 23 + 5 + 11 (+2), Mischdünger

| | |
|-------------------------------------|---|
| 23,0 % N | Gesamtstickstoff 0,5 % N Ammoniumstickstoff 22,5 % N Harnstoffstickstoff |
| 5,0 % P ₂ O ₅ | neutral-ammonicitratlösliches und wasserlösliches Phosphat 3,0 % P ₂ O ₅ wasserlösliches Phosphat |
| 11,0 % K ₂ O | wasserlösliches Kaliumoxid |
| 2,0 % MgO | wasserlösliches Magnesiumoxid |

| | |
|-----------------|--------------------------|
| Granulierung: | 1,0 – 1,7 mm |
| Aufwandmenge: | 20 – 30 g/m ² |
| N/K-Verhältnis: | 2 : 1 |



EMS Magic Somero

17-2-17 (-3)

- 40 % des Gesamtstickstoffes sind umhüllt
- Besonders für die Anwendung im Sommer
- Fein granuliert
- Wirkungsdauer: ca. 2-3 Monate

NPK(Mg)-Dünger, 17-2-17 (-3)

| | |
|-------------------------------------|---|
| 17,0 % N | Gesamtstickstoff 0,5 % N Ammoniumstickstoff 16,5 % N Harnstoffstickstoff |
| 2,0 & P ₂ O ₂ | neutral-ammonocitratlösliches und wasserlösliches Phosphat 0,8 % P ₂ O ₂ wasserlösliches Phosphat |
| 17,0 % K ₂ O | wasserlösliches Kaliumoxid |
| 3,0 % MgO | wasserlösliches Magnesiumoxid |

Granulierung: 1,0 – 1,7 mm
 Aufwandmenge: 20 – 30 g/m²
 N/K-Verhältnis: 1 : 1

EMA Magic Autuno

13-4-20 (-4)

- 50 % des Gesamtstickstoffes sind umhüllt
- Besonders für die Anwendung im Frühsommer oder Herbst geeignet
- Fein granuliert
- Wirkungsdauer: 2-3 Monate

NPK(Mg)-Dünger, 13-4-20 (-4)

| | |
|-------------------------------------|---|
| 13,0 % N | Gesamtstickstoff 1,0 % N Ammoniumstickstoff 12,0 % N Harnstoffstickstoff |
| 4,0 % P ₂ O ₂ | neutral-ammonocitratlösliches und wasserlösliches Phosphat 3,0 % P ₂ O ₂ wasserlösliches Phosphat |
| 20,0 % K ₂ O | wasserlösliches Kaliumoxid |
| 4,0 % MgO | wasserlösliches Magnesiumoxid |

Granulierung: 1,0 – 1,7 mm
 Aufwandmenge: 20 – 30 g/m²
 N/K-Verhältnis: 1 : 2

*Dünger
 mineralisch*

GCP Multigreen Classic Printempo 24-6-14 (-3)

- 50 % des Gesamtstickstoffes sind umhüllt
- Besonders für die Anwendung im Frühjahr
- Kalium liegt als Kaliumnitrat vor
- Wirkungsdauer: 8 – 10 Wochen

NPK(Mg)-Dünger, 24 + 6 + 14 (+3), Mischdünger

| | |
|--------------------------------------|---|
| 24,5 % N | Gesamtstickstoff 4,0 % N Nitratstickstoff 1,5 % N Ammoniumstickstoff 19,0 % N Carbamidstickstoff |
| 6,0 % P ₂ O ₅ | neutral-ammonicitratlösliches und wasserlösliches Phosphat 5,6 % P ₂ O ₅ wasserlösliches Phosphat |
| 14,0 % K ₂ O 3,0 % MgO | wasserlösliches Kaliumoxid wasserlösliches Magnesiumoxid |

Granulierung: 2,2 – 3,5 mm
Aufwandmenge: 25 – 30 g/m²
N/K-Verhältnis: 2 : 1

GCS Multigreen Classic Somero 26-5-20

- 40 % des Gesamtstickstoffes sind umhüllt
- Besonders für den Einsatz im Frühsommer/Sommer
- Kalium liegt als Kaliumnitrat vor
- Wirkungsdauer: 8 – 10 Wochen

NPK-Dünger, 26 + 5 + 20, Mischdünger

| | |
|-------------------------------------|---|
| 26,3 % N | Gesamtstickstoff 5,9 % N Nitratstickstoff 1,2 % N Ammoniumstickstoff 19,2 % N Carbamidstickstoff |
| 5,0 % P ₂ O ₅ | neutral-ammonicitratlösliches und wasserlösliches Phosphat 4,7 % P ₂ O ₅ wasserlösliches Phosphat |
| 20,0 % K ₂ O | wasserlösliches Kaliumoxid |

Granulierung: 2,2 – 3,5 mm
Aufwandmenge: 25 – 30 g/m²
N/K-Verhältnis: 1 : 1

GCA Multigreen Classic Autuno 18-0-30 (-3)

- 50 % des Gesamtstickstoffes sind umhüllt
- Besonders für den Einsatz Ende des Sommers/Herbst
- Kaliumbetont
- Kalium liegt als Kaliumnitrat vor
- Wirkungsdauer: 8 – 10 Wochen

NK(Mg)-Dünger, 18 + 30 (+3), Mischdünger

| | |
|-------------------------|-------------------------------|
| 18,0 % N | Gesamtstickstoff |
| | 8,5 % N Nitratstickstoff |
| | 9,5 % N Carbamidstickstoff |
| 30,0 % K ₂ O | wasserlösliches Kaliumoxid |
| 3,0 % MgO | wasserlösliches Magnesiumoxid |

| | |
|-----------------|--------------------------|
| Granulierung: | 2,2 – 3,5 mm |
| Aufwandmenge: | 25 – 30 g/m ² |
| N/K-Verhältnis: | 1 : 2 |



*Dünger
mineralisch*

GU Multigreen Universal

30-8-8

- 85 % des Gesamtstickstoffes sind umhüllt
- Für die gesamte Vegetationsperiode
- **Nur 2-malige Anwendung pro Jahr**
- Geringer Arbeitsaufwand
- Kalium liegt als Kaliumnitrat vor

Wirkungsdauer:
4 – 6 Monate

NPK-Dünger, 30 + 8 + 8, Mischdünger

| | |
|-------------------------------------|--|
| 30,0 % N | Gesamtstickstoff 2,2 % N Nitratstickstoff 2,2 % N Ammoniumstickstoff 25,6 % N Carbamidstickstoff |
| 8,0 % P ₂ O ₅ | neutral-ammonicitratlösliches und wasserlösliches Phosphat 7,4 % P ₂ O ₅ wasserlösliches Phosphat |
| 8,0 % K ₂ O | wasserlösliches Kaliumoxid |

Granulierung: 2,2 – 3,5 mm
Aufwandmenge: 30 – 40 g/m²
N/K-Verhältnis: 3 : 1

GR Multigreen Starter

23-24-10

- 25 % des Gesamtstickstoffes sind umhüllt
- **Für Neuanlage und Regeneration**
- Phosphorbetonter Starterdünger mit Langzeitstickstoff
- Fördert die Wurzelentwicklung
- Wirkungsdauer: 6 – 8 Wochen

NPK-Dünger, 23 + 24 + 10, Mischdünger

| | |
|--------------------------------------|---|
| 23,0 % N | Gesamtstickstoff 3,2 % N Nitratstickstoff 5,8 % N Ammoniumstickstoff 14,0 % N Carbamidstickstoff |
| 24,0 % P ₂ O ₅ | neutral-ammonicitratlösliches und wasserlösliches Phosphat 22,3 % P ₂ O ₅ wasserlösliches Phosphat |
| 10,0 % K ₂ O | wasserlösliches Kaliumoxid |

Granulierung: 2,2 – 3,5 mm
Aufwandmenge: 25 g/m²



GN Multigreen Quickstart 42-0-0

- 57 % des Gesamtstickstoffes sind umhüllt
- **Ideal für die gezielte Stickstoffgabe zwischendurch**
- Mit Sofort- und Langzeitwirkung
- Staubfrei, schmiert nicht
- Wirkungsdauer: 10 – 12 Wochen

Harnstoff, teilweise umhüllt, 42

42,0 % N Gesamtstickstoff
42,0 % N Carbamidstickstoff

Granulierung: 2,2 – 3,5 mm
Aufwandmenge: 25 g/m²

GS Turfpower Standard 30-5-8 (-3)

- **40 % des Gesamtstickstoffes sind umhüllt**
- Für die gesamte Vegetationsperiode
- Kalium liegt als Kaliumnitrat vor
- Wirkungsdauer: 8 – 10 Wochen

NPK(Mg)-Dünger, 30 + 5 + 8 (+3), Mischdünger

30,0 % N Gesamtstickstoff
2,3 % N Nitratstickstoff
1,2 % N Ammoniumstickstoff
26,5 % N Carbamidstickstoff
5,0 % P₂O₅ neutral-ammoncitratlösliches und
wasserlösliches Phosphat
4,7 % P₂O₅ wasserlösliches Phosphat
8,0 % K₂O wasserlösliches Kaliumoxid
3,0 % MgO wasserlösliches Magnesiumoxid

Granulierung: 2,2 – 3,5 mm
Aufwandmenge: 25 g/m²
NK-Verhältnis: 3 : 1

*Dünger
mineralisch*

GHP Hi-Green Printempo 22-5-10 (-2)

- 53 % Langzeitstickstoff als Methylenurea
- Für die gesamte Vegetationsperiode
- Alle Nährstoffe in jedem Korn
- Wirkungsdauer: 8 – 10 Wochen

GHK Hi-Green NK 15-5-25 (-2)

- 33 % Langzeitstickstoff als Methylenurea
- Besonders für die **Anwendung im Sommer/Herbst**
- Alle Nährstoffe in jedem Korn
- Wirkungsdauer: 8 – 10 Wochen

optimale Granulierung
für Greens

NPK(Mg)-Dünger, mit Formaldehydharnstoff und Spurennährstoffen, 22 + 5 + 10 (+ 2)

| | |
|-------------------------------------|--|
| 22,0 % N | Gesamtstickstoff |
| | 5,4 % N Ammoniumstickstoff |
| | 4,9 % N Carbamidstickstoff |
| | 11,7 % N Formaldehydharnstoff (FH) |
| | 4,6 % kaltwasserlöslicher FH |
| | 4,5 % nur heißwasserlöslicher FH |
| 5,0 % P ₂ O ₅ | neutral-ammonicitratlösliches und wasserlösliches Phosphat |
| | 3,5 % P ₂ O ₅ wasserlösliches Phosphat |
| 10,0 % K ₂ O | wasserlösliches Kaliumoxid |
| 2,0 % MgO | wasserlösliches Magnesiumoxid |
| 0,01 % B | wasserlösliches Bor |
| 0,002 % Cu | wasserlösliches Kupfer |
| 0,2 % Fe | wasserlösliches Eisen |
| 0,002 % Zn | wasserlösliches Zink |

Granulierung: 0,4 – 1,5 mm
Aufwandmenge: 20 – 30 g/m²
N/K-Verhältnis: 2 : 1

NPK(Mg)-Dünger, mit Formaldehydharnstoff und Spurennährstoffen, 15 + 5 + 25 (+2)

Für die Anwendung im Gartenbau

| | |
|-------------------------------------|--|
| 15,0 % N | Gesamtstickstoff |
| | 3,0 % N Ammoniumstickstoff |
| | 6,9 % N Carbamidstickstoff |
| | 5,0 % N Formaldehydharnstoff (FH) |
| | 2,6 % kaltwasserlöslicher FH |
| | 1,9 % nur heißwasserlöslicher FH |
| 5,0 % P ₂ O ₅ | neutral-ammonicitratlösliches und wasserlösliches Phosphat |
| | 4,0 % P ₂ O ₅ wasserlösliches Phosphat |
| 25,0 % K ₂ O | wasserlösliches Kaliumoxid |
| 2,0 % MgO | wasserlösliches Magnesiumoxid |
| 0,01 % B | wasserlösliches Bor |
| 0,002 % Cu | wasserlösliches Kupfer |
| 0,02 % Fe | wasserlösliches Eisen |
| 0,002 % Zn | wasserlösliches Zink |

Granulierung: 0,4 – 1,5 mm
Aufwandmenge: 20 – 30 g/m²
N/K-Verhältnis: 1 : 2

GHR Hi-Green Starter 16-23-10 (-3)

- 31 % Langzeitstickstoff als Methylenurea
- **Für Neuanlage und Regeneration**
- Phosphorbetonter Starterdünger mit Langzeitstickstoff
- Alle Nährstoffe in jedem Korn
- Wirkungsdauer: 8 – 10 Wochen

FER Greentec Eisendünger 4-0-14 + 9 Fe

- Fördert rasches Wachstum selbst bei niedrigen Temperaturen
- Ideal für den Einsatz auf allen Rasenflächen in Frühjahr und Herbst
- Homogener, **fein granulierter Eisendünger** mit hohen Eisen- und Kaliumgehalten
- **staubfrei**

optimale Granulierung
für Greens

NPK(Mg)-Dünger, mit Formaldehydharnstoff, 16 + 23 + 10 (+3)

| | |
|--------------------------------------|---|
| 16,0 % N | Gesamtstickstoff |
| | 5,4 % N Ammoniumstickstoff |
| | 5,6 % N Carbamidstickstoff |
| | 5,0 % N Formaldehydharnstoff |
| | 2,0 % kaltwasserlöslicher Formaldehydharnstoff |
| | 1,9 % nur heißwasserlöslicher Formaldehydharnstoff |
| 23,0 % P ₂ O ₅ | neutral-ammoncitratlösliches und wasserlösliches Phosphat |
| | 18,0 % P ₂ O ₅ wasserlösliches Phosphat |
| 10,0 % K ₂ O | wasserlösliches Kaliumoxid |
| 3,0 % MgO | wasserlösliches Magnesiumoxid |

Granulierung: 0,4 – 1,5 mm
Aufwandmenge: 20 – 30 g/m²

NK-Dünger, mit Eisen (Fe), 4 + 14 (+9 Fe) „Zur Anwendung auf Grünland“

| | |
|-------------------------|----------------------------|
| 4,0 % N | Gesamtstickstoff |
| | 3,0 % N Ammoniumstickstoff |
| | 1,0 % N Carbamidstickstoff |
| 14,0 % K ₂ O | wasserlösliches Kaliumoxid |
| 14,0 % S | wasserlöslicher Schwefel |
| 9,0 % Fe | Eisen |

Granulierung: 1,0 – 1,5 mm
Aufwandmenge: 20 – 30 g/m²

Dünger
mineralisch



DÜNGER flüssig

*Für gesunde
Gräser*

| | |
|--------------------------|-----------|
| HEADLAND-Produkte | |
| Eisendüngerlösung | S. 98 |
| Pflanzenhilfsmittel | S. 99 |
| Düngerlösungen | S. 99-101 |
| Spurennährstoffdünger | S. 102 |
| Tankmixempfehlung | S. 103 |
| Taukontrolle | S. 104 |
| Netzmittel | S. 105 |

| Spezialprogramm | | | Nährstoffgehalte N-P ₂ O ₅ -K ₂ O |
|------------------------|----------------|--------------------------|---|
| HSP | Seamac ProTurf | Eisendüngerlösung | 5 % Fe |
| HAS | Ascoflex | Pflanzenschutzmittel | |
| HNS | Protec Plus | N-Düngerlösung | 28-0-0 |
| HTU | Turfite SR3 | Pflanzenschutzmittel | |
| HVNK | Protec NK | flüssiger NK-Dünger | 8-0-8 |
| HVK | Protec K | Kaliumsulfatlösung | 0-0-25 |
| HTH | Turf Hardener | N-Düngerlösung | 8-0-0 (-9 CaO -2 MgO) |
| HEV | Elevate Fe | N-Düngerlösung mit Eisen | 6-0-0 + 5 % Fe |
| HTC | Turfcomplex | Spurennährstoffdünger | |
| HTE | TEMAG Elite | Spurennährstoffdünger | |

| Netzmittel | | |
|-------------------|------------------|-------------------------|
| DEW | DewCure | Langzeit-Taukontrolle |
| TRI | TriCure Granular | granuliertes Netzmittel |
| TRIC | TriCure Fluid | 3-fach Netzmittel |



Die Rasenpflege, besonders bei speziellen Rasenflächen im Golfbereich oder auch bei hochwertigen Sportrasenflächen, unterliegt zunehmend extremen Umwelteinflüssen. Dabei werden die Ansprüche der Nutzer immer höher.

Dem gegenüber steht die Anwendung von Pflanzenschutzmitteln im Fokus der Öffentlichkeit und wird in Zukunft noch weiter eingeschränkt werden. Daher unterstützen wir Sie mit unserem Produktprogramm bei der natürlichen Gesunderhaltung der Rasenflächen, denn die Produkte sind gezielt in verschiedenen Situationen und Jahreszeiten einsetzbar.

Fragen Sie unsere Außendienstmitarbeiter – wir arbeiten Ihnen individuell zugeschnittene Maßnahmen aus.

Ziele des Einsatzes der Flüssigprodukte:

- verbesserter Gesundheitszustand der Gräser
- erhöhte Widerstandsfähigkeit in Stresssituationen
- Stimulierung des Bodenlebens als Grundlage für starkes Wurzelwachstum
- Behebung von Defiziten in der Spurennährstoffversorgung

Dünger
flüssig

HSP Seamac Proturf**5,0 % Fe**

- Flüssiger Dünger mit 5 % Eisen, der auch 2,1 % Stickstoff und 1,2 % MgO enthält
- **Mit Algenextrakten**
- Für rasche und langanhaltende Grünfärbung
- Ideale Tankmix-Komponente bei Anwendungen zur Pflanzenstärkung

Flüssige Meeresalgen mit Stickstoff, Magnesium, Schwefel und Eisen

| | % kg/kg | % kg/l |
|---|------------|------------|
| Gesamtstickstoff (N) | 2,1 % | 2,5 % |
| Nitratstickstoff (N-NO ₃) | 1,1 % | 1,3 % |
| Ammoniumstickstoff (N-NH ₄) | 1,0 % | 1,2 % |
| Schwefel (S) | 10,2 % | 13,0 % |
| Magnesiumoxid (MgO) | 1,2 % | 1,5 % |
| | (0,7 % Mg) | (0,9 % Mg) |

| | | |
|-------|-------|-------|
| Eisen | 5,0 % | 6,0 % |
|-------|-------|-------|

Inhalt: 10 l (12,1 kg)**ANWENDUNGSZEITRAUM:**

Während der gesamten Vegetationsperiode.

AUFWANDMENGEN:

20 – 30 Liter/ha

HAS Ascoflex

- 100 % organisches, konzentriertes **flüssiges Algenextrakt**
- Durch die Kaltwasserextraktion werden die natürlichen Inhaltsstoffe der Algen geschont
- Enthält Spurennährstoffe und pflanzliche Aminosäuren
- Keine Störpartikel, die die Düsen verstopfen könnten
- Anwendung im Frühjahr führt zu verbesserter Bestockung und dichterem, belastbarerem Narbe
- Anwendung im Spätsommer/Herbst verzögert die Alterung der Gräser und sorgt für eine bessere Überwinterung

Pflanzenhilfsmittel unter Verwendung von Algen und pflanzlichen Aminosäuren

32 % organische Substanz bewertet als Glühverlust

Zur Unterstützung der Aminosäureproduktion und der Regeneration in/nach Stresssituationen.

Ausgangsstoffe: 93 % Algen, pflanzliche Aminosäuren

Inhalt: 10 l (11,0 kg)**ANWENDUNGSZEITRAUM:**

Mai – September.

AUFWANDMENGEN:

10 Liter/ha

HNS Protec Plus

28-0-0

- **59 % Langzeitstickstoff**
- Flüssiger Stickstoffdünger mit rascher und anhaltender Wirkung
- Für ein gleichmäßiges Wachstum der Gräser
- Wirkungsdauer bis zu 4 Wochen

Stickstoff-Dünger-Lösung mit Formaldehydharnstoff, 28

28 % N Gesamtstickstoff
 11,5 % N Carbamidstickstoff
 16,5 % N Formaldehydharnstoff

Inhalt: 10 l (12,9 kg)

ANWENDUNGSZEITRAUM:

Mai – September (Bodentemperatur > 14° C)

AUFWANDMENGEN:

20 – 60 Liter/ha

HTU Turfite SR3

- Phosphitfreie Formulierung mit Glycinbetain, Salicylsäure und Pidolsäure
- **Steigerung der natürlichen Krankheitstoleranz** durch Verbesserung des Wurzelwachstums
- Ideale Tankmix-Komponente zur Pflanzenstärkung

Pflanzenhilfsmittel, einzelgenehmigt gemäß §9a DMG 1994

Ausgangsstoffe:
 Glycinbetain, Salicylsäure, Kaliumcarbonat, Pidolsäure, Konservierungsmittel, Wasser

Inhalt: 10 l (10,3 kg)

ANWENDUNGSZEITRAUM:

Während der gesamten Vegetationsperiode.

AUFWANDMENGEN:

10 – 20 Liter/ha

*Dünger
flüssig*

HVNK Protec NK**8-0-8**

- Flüssiger NK-Dünger **mit rascher Wirkung**
- Enthält Nitrat- und Carbamidstickstoff für eine schnelle und mittelfristige Wirkung auch bei niedrigen Temperaturen
- Schwefelfrei
- Kalium liegt als Kaliumnitrat vor

NK-Düngerlösung, 8-8

| | |
|------------------------|----------------------------|
| 8,0 % N | Gesamtstickstoff |
| | 2,0 % N Nitratstickstoff |
| | 6,0 % N Carbamidstickstoff |
| 8,0 % K ₂ O | wasserlösliches Kaliumoxid |

Inhalt: 10 l (11,9 kg)**ANWENDUNGSZEITRAUM:**

Während der gesamten Vegetationsperiode.

AUFWANDMENGEN:

| | |
|---------------|---|
| Blattdüngung: | 40 – 80 Liter/ha mit 300 – 600 Liter Wasser spritzen. |
| Normal: | 100 Liter/ha mit 450 – 600 Liter Wasser spritzen. |
| Hoch: | 150 Liter/ha mit 450 – 600 Liter Wasser spritzen. |

Protec NK zunächst in die Hälfte der gewünschten Wassermenge geben und 5 Minuten mischen; danach komplett füllen.

HVK Protec K**0-0-25**

- **Flüssiger Kaliumdünger** mit hohem Nährstoffgehalt
- Rasche Wirkung
- Fördert die Trockenheits- und Krankheitstoleranz

Kaliumsulfatlösung, 25-17

| | |
|-----------------------|----------------------------|
| 25 % K ₂ O | wasserlösliches Kaliumoxid |
| 17 % S | wasserlöslicher Schwefel |

Inhalt: 10 l (14,5 kg)**ANWENDUNGSZEITRAUM:**

Während der gesamten Vegetationsperiode.

AUFWANDMENGEN:

| | |
|----------------|---|
| Blattdüngung: | 10 – 20 Liter/ha mit 300 Liter Wasser spritzen. |
| Spoon-Feeding: | 20-40 Liter/ha mit 450-600 Liter Wasser spritzen. |
| Normal: | 60-80 Liter/ha mit 450-600 Liter Wasser spritzen. |

Protec K zunächst in die Hälfte der gewünschten Wassermenge geben und dann 5 Minuten mischen; danach komplett füllen.

HTH Turf Hardener

8 (-9-2)

- Flüssiger Nitrat-, Calcium und Magnesium-Dünger
- Rasche Wirkung **auch bei niedrigen Temperaturen**
- Für alle strapazierten Rasenflächen
- Ideale Tankmix-Komponente bei Anwendungen zur Pflanzenstärkung

Kalksalpeterlösung, 8 (-9-2)

| | |
|---------|-------------------------------|
| 8 % N | Gesamtstickstoff |
| | 8 % N Nitratstickstoff |
| 9 % CaO | wasserlösliches Calciumoxid |
| 2 % MgO | wasserlösliches Magnesiumoxid |

Inhalt: 10 l (14,0 kg)

ANWENDUNGSZEITRAUM:

Während der gesamten Vegetationsperiode.

AUFWANDMENGEN:

10-40 Liter/ha

HEV ELEVATE

6-0-0 + 5 % Fe

- Flüssiger Stickstoff-Eisendünger
- Schnelle Aufnahme und Grünfärbung. **Keine Verfärbungen an den Blättern**
- Keine schwarzen Fahrspuren nach der Anwendung
- Sichere Anwendung auch im Sommer

Flüssige Eisen-Formulierung

| | % kg/kg | % kg/l |
|-----------------------------|---------|--------|
| Gesamtstickstoff | 6,0 % | 8,0 % |
| Ammoniumstickstoff | 6,0 % | 8,0 % |
| Schwefel (S) | 5,0 % | 6,0 % |
| Eisen (Fe) | 5,0 % | 6,0 % |
| Spezifisches Gewicht – 1,28 | | |

Inhalt: 10 l (12,8 kg)

ANWENDUNGSZEITRAUM:

Während der gesamten Vegetationsperiode.

AUFWANDMENGEN:

Normal: 20 Liter/ha mit 300-450 Liter Wasser spritzen.
Hoch: 40 Liter/ha mit 300-450 Liter Wasser spritzen.

Elevate Fe zunächst in die Hälfte der gewünschten Wassermenge geben und dann 5 Minuten mischen; danach komplett füllen.

*Dünger
flüssig*

HTC Turfcomplex

- Flüssiger Spurennährstoff-Dünger mit Huminsäuren
- **Mit Algenextrakten**, durch die Kaltwasserextraktion werden die natürlichen Inhaltsstoffe der Algen geschont
- Unterstützt die Stresstoleranz der Gräser
- Ideale Tankmix-Komponente bei Anwendungen zur Pflanzenstärkung

Spurennährstoff-Mischdüngerlösung

| | % kg/kg | % kg/l |
|---|------------|------------------------------------|
| Gesamtstickstoff (N) | 1,40 % | 1,60 % |
| Nitratstickstoff (N-NO ₃) | 1,20 % | 1,40 % |
| Carbamidstickstoff (N-NH ₂) | 0,18 % | 0,20 % |
| Phosphorpentoxid (P ₂ O ₅) | 0,18 % | 0,20 % |
| | (0,07 % P) | (0,09 % P) |
| Kaliumoxid (K ₂ O) | 1,05 % | 1,20 % |
| | (0,87 % K) | (1,0 % K) |
| Magnesiumoxid (MgO) | 0,09 % | 0,10 % |
| Bor (B) | 0,026 % | 0,030 % |
| Kupfer (Cu) als Chelat von EDTA | 0,35 % | 0,40 % |
| Eisen (Fe) als Chelat von EDTA | 1,10 % | 1,25 % |
| Mangan (Mn) als Chelat von EDTA | 1,40 % | 1,60 % |
| Molybdän (Mo) | 0,018 % | 0,020 % |
| Zink (Zn) als Chelat von EDTA | 0,035 % | 0,040 % |
| Huminsäure - 3,5 % | | Meeresalgenextrakt (Algifol) - 5 % |

Praktische pH-Stabilität in Bereich 4–9 in wässriger Lösung.
Spezifische Dichte - 1,14

Inhalt: 10 l (11,4 kg)

ANWENDUNGSZEITRAUM:

Während der gesamten Vegetationsperiode.

AUFWANDMENGEN:

20-40 Liter/ha

HTE TEMAG Elite

- Qualitativ **hochwertiger Spurennährstoffdünger** mit Stickstoff
- Ideal zur Behebung von Spurennährstoffdefiziten
- Unterstützt die Stresstoleranz der Gräser
- Zur Blattdüngung auf allen Rasenflächen

Anorganischer Dünger mit Spurennährstoffmischung

| | |
|------------------------|----------------------------|
| 9,2 % N | Gesamtstickstoff |
| | 9,2 % N Ammoniumstickstoff |
| 1,8 % MgO | Magnesiumoxid (1,1 % Mg) |
| 20,8 % SO ₃ | Schwefeltrioxid (8,3 % S) |
| 0,1 % Cu | Kupfer als Chelat von EDTA |
| 9,0 % Fe | Eisen als Chelat von EDTA |
| 1,1 % Mn | Mangan als Chelat von EDTA |
| 0,06 % Mo | wasserlösliches Molybdän |
| 0,5 % Zn | Zink als Chelat von EDTA |

Gute Chelatstabilität im pH-Bereich zwischen pH 4 und pH 9
(in wässriger Lösung).

Inhalt: 6,0 kg

ANWENDUNGSZEITRAUM:

Während der gesamten Vegetationsperiode.

AUFWANDMENGEN:

6 – 12 kg/ha

Tankmixempfehlungen

Hier finden Sie beispielhafte Tankmixempfehlungen. Die Möglichkeiten der Kombination nach Ihren Wünschen sind jedoch sehr vielfältig.

Bei Fragen zur Reihenfolge der Zugabe in den Tank oder Mischbarkeit Ihres eigenen Rezeptes stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.



Golfclub St. Leon-Rot, Solheim-Cup 2015

HERBST-/FRÜHJAHR-STÄRKUNG

- Anwendung von September bis April
- Verbesserung der Krankheitstoleranz
- Bei niedrigen Bodentemperaturen
- Zur Stärkung der Gräser

Seamac Proturf
Eisendünger
30l/ha

+

Turfite SR3
Pflanzenhilfsmittel
20 l/ha

+

Turf Hardener
8-0-0 (-9-2)
20 l/ha

in

400 l/ha
Spritzvolumen

SOMMER-MIX

- Anwendung von Mitte Mai bis Ende August
- Mit Eisen für eine schöne sattgrüne Farbe
- Sommerdüngung für konstanten Wuchs ohne Stoßwachstum

Solufeed
NK 15-0-25
10 - 20 kg/ha

+

Protec Plus
28-0-0
20-40 l/ha

+

Seamac Proturf
Eisendünger
20 l/ha

in

400 l/ha
Spritzvolumen

STRESSABBAU

- Anwendung von April bis Oktober
- Erhöht die Widerstandsfähigkeit in Stresssituationen
- Bei niedrigen Bodentemperaturen
- Zur Anwendung bei/nach Krankheitsdruck, Nematodenbefall oder Trockenheit

TEMAG Elite
Spurennährstoffe
6 kg/ha

+

Ascoflex Plus
Algenextrakte
20 l/ha

+

Turfite SR3
Pflanzenhilfsmittel
30 l/ha

in

400 l/ha
Spritzvolumen

BODENKUR

- Anwendung von April bis Oktober
- Zur Aktivierung des Bodenlebens

Ascoflex Plus
Algenextrakte
20 l/ha

+

Turfcomplex
Spurennährstoffe
20-40 l/ha

in

400-600 l/ha
Spritzvolumen

*) Solufeed NK: nähere Informationen auf Anfrage

Blattfeuchtigkeit besteht aus:

ca. 70 % Tautropfen



ca. 30 % Guttationstropfen



Kontrolle links, Anwendung von DewCure rechts

- DewCure auf trockenen Rasen ausbringen
- Windabdrift vermeiden
- Nicht über die Beregnungsanlage applizieren
- Anwendungsintervalle von mindestens 14 Tagen einhalten
- Um Regenfestigkeit zu erreichen, nach der Ausbringung das Abtrocknen ermöglichen
- DewCure sollte nicht auf mehrfach gestresste Flächen ausgebracht werden (Wassersättigung + Filz + Frost)
- **Keine Mischung** mit Pflanzenschutzmitteln oder Flüssigdüngern: Diese 5 – 7 Tage vor oder nach der Applikation von DewCure ausbringen, um die Wirkung nicht zu beeinträchtigen

DEW DewCure – Taukontrolle

- Reduziert Blattfeuchtigkeit und unterdrückt Tau- und Guttationstropfenbildung
- Erhöhter Langzeiteffekt im Vergleich zu konventionellen Taukontrolleprodukten
- Schnelles Abtrocknen nach Niederschlägen oder Beregnung
- Weniger Feuchtigkeit auf den Blättern hilft, den Krankheitsdruck zu reduzieren
- Unterdrückt Raureifbildung an den Blättern. Bei starkem Frost bilden sich deutlich Eiskristalle, die jedoch rascher abtauen

ANWENDUNGSZEITRAUM:



Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sept Okt Nov Dez

AUFWANDSMENGEN:

6 Liter/ha mit 400 l Wasser spritzen. **(1,5 % DewCure)**

ANWENDUNGSBEREICH:

DewCure ist geeignet für die Ausbringung auf allen Rasenflächen.

ANWENDUNGSINTERVALLE:

Aktives Wachstum: 14-tägig

Langsames Wachstum: 4-wöchig

Turnier: ein Tag vor dem Wettbewerb

TRI TriCure Granular – granuliertes Netzmittel

- Granuliertes Netzmittel
- Ideal zur Behandlung von Trockenstellen im Rasen
- Zur punktuellen Ausbringung auf Problemstellen (z. B. Randzonen, Kuppen, Bunkeranten)
- Einfach per Hand oder mit einem Kastenstreuer ausstreuen
- **Ideal auch für den Einsatz im Hausgarten**

ANWENDUNGSZEITRAUM:



Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sept Okt Nov Dez

AUFWANDMENGEN:

120 kg/ha (bzw. 12 g/m²) bei kurativer/monatlicher Anwendung
 240 kg/ha (bzw. 24 g/m²) bei vierteljährlicher Anwendung

ANWENDUNGSBEREICH:

TriCure ist geeignet für die Ausbringung auf allen Rasenflächen

TRIC TriCure Fluid – flüssiges Netzmittel

- Flüssiges Netzmittel, ideal zur großflächigen Anwendung
- Dreifach-Wirkungsweise zur Verbesserung der Wasserverteilung und der Benetzung von organischen und mineralischen Bodenpartikeln
- Variable Aufwandmenge je nach vorherrschenden Temperaturen, ohne dass die Wirksamkeit in Bezug auf Benetzung, Eindringung oder Wirkungsdauer leidet

ANWENDUNGSZEITRAUM:



Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sept Okt Nov Dez

AUFWANDMENGEN:

Frühsommer: 7 l/ha
 Temperaturen < 20 °C: 10 l/ha
 Temperaturen > 20 °C: 14 l/ha
 Temperaturen > 25 °C: 20 l/ha
 Jeweils mit 600 – 800 Liter Wasser spritzen. (monatliche Erhaltungsanwendung) 20 Liter / ha bei hohem Trockenstress oder bereits existierenden Trockenflecken

TriCure – Netzmittel – für einen ausgeglichenen Wasserhaushalt:

Zur vorbeugenden und kurativen Behandlung von wasserabweisenden Bereichen im Boden. Alle unsere TriCure-Produkte zeichnen sich durch drei verschiedene Wirkweisen aus. Zum einen dringt Niederschlag bzw. Beregnungswasser nach der Anwendung wieder besser in den Boden ein (= Durchfeuchtung), zum anderen werden sowohl organische Oberflächen (z. B. Torf, Filz) als auch mineralische Bodenbestandteile optimal benetzt (= Wasserspeicherung). Es wird also das Eindringen, das Verbreiten und das Halten des Wassers im Boden gefördert. TriCure ist sehr sicher in der Anwendung. Die Wirkungsdauer beträgt 3 – 4 Wochen. TriCure liefert außerdem sehr gute Ergebnisse bei der Wiederbefeuchtung des Bodens unter Hexenringen.

*Dünger
flüssig*



DÜNGER organisch

*Die natürliche
Alternative*

| | |
|--------------------------------|------------|
| BUGA®-Rasendünger | |
| Erhaltungsdünger | S. 108-111 |
| Starterdünger – Bodenaktivator | S. 109 |
| Herbstdünger | S. 109 |
| Rasenkalk | S. 111 |

BUGA® Rasendünger

Das BUGA® Rasendünger-Programm besteht aus verschiedenen NPK-Düngern auf Basis hochwertiger organischer und mineralischer Ausgangsstoffe.

- mit natürlicher Langzeitwirkung
- mit bodenverbessernden Inhaltsstoffen
- mit wertvollen Spurennährstoffen
- unterschiedliche Granulatgrößen vom Standardgranulat bis zur superfeinen Minikon-Qualität erhältlich

Ideal auch zur Ergänzung der mineralischen Düngung auf sandreichen Tragschichten.

BUGA® Rasendünger sind für ein besseres Wachstum und eine gesunde Pflanzenentwicklung mit wertvollen Komponenten angereichert. Dazu gehören beispielsweise lebende Mykorrhiza-Pilze oder Meeressalgen.

BUGA® Rasendünger bilden in Verbindung mit der mineralischen Nährstoffversorgung und den sonstigen Pflegemaßnahmen ein ideales Gleichgewicht zur Etablierung und Erhaltung aller Rasenflächen.

| Programmübersicht BUGA®-Dünger | | Nährstoffgehalte N-P ₂ O ₅ -K ₂ O (- MgO) | Granulierung in mm | Form |
|--------------------------------|----------------------------------|---|-----------------------|----------|
| D2 | BUGA® Spezial | 12-4-8(-3) | 1,0-5,0 | Granulat |
| D3 | BUGA® Minikon | 12-4-8(-3) | 1,0-4,0 | Prills |
| D4 | BUGA® Mycostart – Bodenaktivator | 4-3,5-2 | 1,0-5,0 | Granulat |
| D5 | BUGA® Herbst | 6-3-18(-3) | 1,0-4,0 | Prills |
| D6 | BUGA® Aktiv | 12-1,5-6(-2) | 1,0-5,0 | Granulat |
| D7 | BUGA® Vegalin | 8-4-8 (-3) | 1,0-4,0 | Prills |
| D8 | BUGA® Natur-Rasendünger | 6-4-9 | 1,0-5,0 | Granulat |
| D9 | BUGA® Rasenkalk | 11 % MgCO ₃ / 80,0 % CaCO ₃ | 2,0-5,0 | Granulat |



Granulat – D2, D4, D6, D8



Prills – D3, D5, D7

D 2 BUGA® Spezial**12-4-8(-3)**

- NPK-Dünger und Bodenaktivator
- **Mit Meeresalgen**
- Mit Eisen und anderen Spurennährstoffen
- Fördert die Bodenfruchtbarkeit, das Bodenleben und die Humusbildung

Organisch-mineralischer NPK-Dünger**12 + 4 + 8 (+3)**

Unter Verwendung von pflanzlichen Stoffen aus der Lebens- und Genuss- und Futtermittelherstellung und tierischen Nebenprodukten (Kat 3. gemäß VO (EG) Nr. 1069/2009) und Hühnertrockenkot und mineralischen Düngern.

| | |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| 12,0 % N | Gesamtstickstoff |
| | 3,5 % N Ammoniumstickstoff |
| | 5,0 % N Carbamidstickstoff |
| | 3,5 % N Organischer Stickstoff |
| 4,0 % P ₂ O ₅ | Gesamtphosphat |
| 8,0 % K ₂ O | Gesamtkaliumoxid |

Nettomasse: 25 kg

Nebenbestandteile:

| | |
|-----------|---|
| 6,0 % S | Schwefel |
| 0,5 % Fe | Eisen |
| 3,0 % MgO | Magnesiumoxid |
| 30,0 % | Organische Substanz i.d. Frischmasse (32 % i.d. TS) |

Ausgangsstoffe:

Fleischknochenmehl (Kat.3.), Hühnertrockenkot, Algenextrakt, Vinsasse, Harnstoff, Ammoniumsulfat, Diammoniumphosphat, Magnesiumoxid und Eisensulfat

Aufwandmenge

| | | |
|-------------------------------|---------------------|--------------------------|
| Rasen | - Neuanlage: | 100 g/m ² |
| | - Erhaltung/Pflege: | 50 – 70 g/m ² |
| Bäume, Zierpflanzen, Stauden: | | 60 g/m ² |

D 3 BUGA® Minikon**12-4-8(-3)**

- NPK-Dünger und Bodenaktivator
- **Mit Meeresalgen**
- Mit Eisen und anderen Spurennährstoffen
- Fördert die Bodenfruchtbarkeit, das Bodenleben und die Humusbildung
- **Jedoch Feine Miniprills**

Organisch-mineralischer NPK-Dünger**12 + 4 + 8 (+3)**

Unter Verwendung von pflanzlichen Stoffen aus der Lebens- und Genuss- und Futtermittelherstellung und tierischen Nebenprodukten (Kat 3. gemäß VO (EG) Nr. 1069/2009) und Hühnertrockenkot und mineralischen Düngern.

| | |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| 12,0 % N | Gesamtstickstoff |
| | 3,5 % N Ammoniumstickstoff |
| | 5,0 % N Carbamidstickstoff |
| | 3,5 % N Organischer Stickstoff |
| 4,0 % P ₂ O ₅ | Gesamtphosphat |
| 8,0 % K ₂ O | Gesamtkaliumoxid |

Nettomasse: 25 kg

Nebenbestandteile:

| | |
|-----------|---|
| 6,0 % S | Schwefel |
| 0,5 % Fe | Eisen |
| 3,0 % MgO | Magnesiumoxid |
| 30,0 % | Organische Substanz i.d. Frischmasse (32 % i.d. TS) |

Ausgangsstoffe:

Fleischknochenmehl (Kat.3.), Hühnertrockenkot, Algenextrakt, Vinsasse, Harnstoff, Ammoniumsulfat, Diammoniumphosphat, Magnesiumoxid und Eisensulfat

Aufwandmenge

| | | |
|-------|---------------------|--------------------------|
| Rasen | - Neuanlage: | 100 g/m ² |
| | - Erhaltung/Pflege: | 50 – 70 g/m ² |

D 4 BUGA® Mycostart – Bodenaktivator

4-3,5-2

- Mit lebenden **Mykorrhiza-Pilzen**
- Mit Eisen und anderen Spurennährstoffen
- Fördert die Bodenfruchtbarkeit, das Bodenleben und die Humusbildung

Organischer NPK-Dünger

4 + 3,5 + 2

Unter Verwendung von pflanzlichen Stoffen aus der Lebens- und Genuss- und Futtermittelherstellung und tierischen Nebenprodukten (Kat 3. gemäß VO (EG) Nr. 1069/2009) und Hühnertrockenkot.

| | |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| 4,0 % N | Gesamtstickstoff |
| | 4,0 % N Organischer Stickstoff |
| 3,5 % P ₂ O ₅ | Gesamtphosphat |
| 2,0 % K ₂ O | Gesamtkaliumoxid |

Nettomasse: 25 kg

Ausgangsstoffe:

Haarmehl (Kat.3.), Hühnertrockenkot, Pressrückstände von Ölsaaten, Biolit, Naturphosphat, Mykorrhiza-Pilze

55 % Organische Substanz i.d. Frischmasse (60 % i.d. TS)

Aufwandmenge

| | | |
|-------------------------------|-----------------|----------------------|
| Rasen | - Neuanlage: | 200 g/m ² |
| | - Regeneration: | 70 g/m ² |
| Bäume, Zierpflanzen, Stauden: | | 100 g/m ² |
| Substratmischung: | | 15 kg/m ³ |

D 5 BUGA® Herbst

6-3-18(-3)

- NPK-Dünger und Bodenaktivator
- Mit Spurennährstoffen
- Fördert die Bodenfruchtbarkeit, das Bodenleben und die Humusbildung
- **Kaliumbetont** – Verbesserung der Widerstandskraft vor dem Winter

Organisch-mineralischer NPK-Dünger mit Magnesium

6 + 3 + 18 (+3)

Unter Verwendung von pflanzlichen Stoffen aus der Lebens- und Genuss- und Futtermittelherstellung und tierischen Nebenprodukten (Kat 3. gemäß VO (EG) Nr. 1069/2009) und Hühnertrockenkot und mineralischen Düngern.

| | |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| 6,0 % N | Gesamtstickstoff |
| | 3,0 % N Carbamidstickstoff |
| | 3,0 % N Organischer Stickstoff |
| 3,0 % P ₂ O ₅ | Gesamtphosphat |
| 18,0 % K ₂ O | Gesamtkaliumoxid |

Nettomasse: 25 kg

Nebenbestandteile:

| | |
|-----------|---|
| 6,0 % S | Schwefel |
| 0,5 % Fe | Eisen |
| 3,0 % MgO | Magnesiumoxid |
| 25,0 % | Organische Substanz i.d. Frischmasse (27 % i.d. TS) |

Ausgangsstoffe:

Fleischknochenmehl (Kat.3.), Hühnertrockenkot, Haarmehl, Vinasse, Harnstoff, Magnesiumoxid und Eisensulfat

Aufwandmenge

| | |
|-------------------------------|--------------------------|
| Rasen: | 50 – 70 g/m ² |
| Bäume, Zierpflanzen, Stauden: | 60 g/m ² |
| Substratmischung: | 8 kg/m ³ |

Dünger
organisch

D 6 BUGA® Aktiv**12-1,5-6(-2)**

- Organisch-mineralischer NPK-Dünger mit Sofort- und Langzeitwirkung
- **Bacillus subtilis fördert das Wurzelwachstum und steigert die Widerstandskraft der Gräser**
- Auch für die Düngung von Bäumen und Ziergehölzen geeignet
- Fördert Bodenfruchtbarkeit, Bodenleben und Humusbildung

Organisch-mineralischer NPK-Dünger**12 + 1,5 + 6**

Unter Verwendung von pflanzlichen Stoffen aus der Lebens- und Genuss- und Futtermittelherstellung, Hühnertrockenkot und mineralischen Düngern.

| | |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| 12,0 % N | Gesamtstickstoff |
| | 1,5 % N Ammoniumstickstoff |
| | 8,4 % N Carbamidstickstoff |
| | 2,1 % N Organischer Stickstoff |
| 1,5 % P ₂ O ₅ | Gesamtphosphat |
| 6,0 % K ₂ O | Gesamtkaliumoxid |

Nettomasse: 25 kg

Nebenbestandteile:

| | |
|-----------|---|
| 3,3 % S | |
| 0,5 % Fe | |
| 3,0 % MgO | |
| 36,0 % | Organische Substanz i.d. Frischmasse (33 % i.d. TS) |

Ausgangsstoffe:

Hühnertrockenkot, Ammoniumsulfat, Harnstoff, Kaliumsulfat, Magnesiumoxid, Eisensulfat und Bacillus subtilis

Aufwandmenge

| | | |
|-------------------------------|---------------------|--------------------------|
| Rasen | - Neuanlage: | 100 g/m ² |
| | - Erhaltung/Pflege: | 50 – 70 g/m ² |
| Bäume, Zierpflanzen, Stauden: | | 60 g/m ² |

D 7 BUGA® Vegalin**8-4-8(-3)**

- Organisch-mineralischer NPK-Dünger mit Sofort- und Langzeitwirkung
- Sehr feine Minikon-Granulierung (Prills)
- Hergestellt aus **rein pflanzlichen Rohstoffen und mineralischen Komponenten; keine tierischen Ausgangsstoffe**
- Hervorragend auch für die Düngung von Pferdeweiden, Gemüse, Obst, Bäumen und Ziergehölzen

Organisch-mineralischer NPK-Dünger mit Magnesium**8 + 4 + 8 (+3)**

Unter Verwendung von pflanzlichen Stoffen aus der Lebens- und Genuss- und Futtermittelherstellung und mineralischen Düngern.

| | |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| 8,0 % N | Gesamtstickstoff |
| | 2,0 % N Ammoniumstickstoff |
| | 3,0 % N Carbamidstickstoff |
| | 3,0 % N Organischer Stickstoff |
| 4,0 % P ₂ O ₅ | Gesamtphosphat |
| 8,0 % K ₂ O | Gesamtkaliumoxid |

Nettomasse: 25 kg

Nebenbestandteile:

| | |
|-----------|---|
| 3,5 % S | Schwefel |
| 3,0 % MgO | Magnesiumoxid |
| 30,0 % | Organische Substanz i.d. Frischmasse (33 % i.d. TS) |

Ausgangsstoffe:

Pressrückstände von Ölsaaten, Vinasse, Harnstoff, Ammoniumsulfat, Diammoniumphosphat, Magnesiumcarbonat

Aufwandmenge

| | | |
|-------|---------------------|--------------------------|
| Rasen | - Neuanlage: | 100 g/m ² |
| | - Erhaltung/Pflege: | 50 – 70 g/m ² |

D 8 BUGA® Natur-Rasendünger 6-4-9

- **100 % organisch**
- Milde Wirkung für kontrolliertes Wachstum und kräftige Wurzelbildung
- Wirkungsdauer 3-4 Monate

Organischer NPK-Dünger

6 + 4 + 9

Unter Verwendung von pflanzlichen Stoffen aus der Lebens- und Genuss- und Futtermittelherstellung und tierischen Nebenprodukten (Kat 3. gemäß VO (EG) Nr. 1069/2009) und Hühnertrockenkot.

| | |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| 6,0 % N | Gesamtstickstoff |
| | 6,0 % N Organischer Stickstoff |
| 4,0 % P ₂ O ₅ | Gesamtphosphat |
| 9,0 % K ₂ O | Gesamtkaliumoxid |

Nettomasse: 25 kg

Nebenbestandteile:

| | |
|---------|---|
| 3,0 % S | Schwefel |
| 55,0 % | Organische Substanz i.d. Frischmasse (59 % i.d. TS) |

Ausgangsstoffe:

Fleischknochenmehl (Kat.3.), Blutmehl, Haarmehl, Knochenmehl, Pressrückstände von Ölsaaten, Vinsasse

Aufwandmenge

| | | |
|-------------------------------|-----------------|----------------------------|
| Rasen | - Neuanlage: | 100 – 200 g/m ² |
| | - Regeneration: | 60 – 120 g/m ² |
| Bäume, Zierpflanzen, Stauden: | | 50 – 120 g/m ² |

D 9 BUGA® Rasenkalk 80

- Zur Förderung von Wurzelbildung, Zellaufbau und Wachstum
- Fördert physikalische und chemische Bodeneigenschaften sowie das Bodenleben
- Hochwertiger, natürlicher Dünger zur biologischen Bodenverbesserung
- **Hervorragende Löslichkeit**

Kohlensaurer Kalk, leicht umsetzbar

80

Naturreiner Kalk aus Algenablagerungen. Geperlt – staubfrei, magnesiumhaltig, für Gartenbaugewerbe, Haus- und Hobbygärten. Bewirkt die Bodenaktivierung und eine rasche pH-Wert-Anhebung. Kann zu jeder Jahreszeit und in wachsende Kulturen gestreut werden. Vorteilhaft ist eine nachfolgende Einarbeitung.

| | |
|--------|-------------------------------------|
| 80,0 % | CaCO ₃ Calciumcarbonat |
| 11,0 % | MgCO ₃ Magnesiumcarbonat |

Nettomasse: 25 kg

Ausgangsstoffe:

Naturreiner Kalk aus Algenablagerungen

Aufwandmenge

| | |
|----------------|----------------------------|
| Leichte Böden: | 60 – 80 g/m ² |
| Schwere Böden: | 120 – 140 g/m ² |

Dünger
organisch



FERTIGGRASEN

*Die schnellste Art
der Begrünung*

| | |
|--|--------|
| F 1 BUGA® Sportrasen | S. 114 |
| F 2 Gebrauchsrasen – Spielrasen | S. 114 |
| F 4 / F 44 Fertiggrasen für Schattenlagen | S. 115 |
| F 8 Rustica | S. 115 |
| HN 1 Holznägel | S. 115 |

Fertigrasen – wo Sie ihn brauchen

Unsere Produktionsstandorte ermöglichen in vielen Gebieten Deutschlands eine schnelle und kostengünstige Lieferung. In der Regel reicht eine Vorbestellung von 2 – 3 Tagen, und Sie erhalten am gewünschten Tag den frischen Rasen.

Besonders wichtig ist die richtige Auswahl des Rasentyps für Ihr Projekt. Verlassen Sie sich auf die Beratung unseres Fachpersonals, um mit Ihrem Projekt erfolgreich zu sein. Wir beachten in unserer Beratung nicht nur die fachlichen Grundlagen, sondern suchen die für Sie wirtschaftlichste Lösung, um Ihr Projekt in allen Aspekten zum Erfolg zu führen.

Die Verlegung von Fertigrasen:

Bitte fragen Sie Preise
frei Baustelle bei uns an!

- termingerechte Bestellung oder Abholung
- Transportsicherung der Paletten bei Abholung
- Zwischenlagerung möglichst im Schatten und so kurz wie möglich
- Reduzierung der Stapelhöhe und gleichmäßiges Abarbeiten aller Paletten
- Startdüngung (z. B. Hi-Green Starter)
- sofortige Wässerung bereits von Teilbereichen
- andrücken zur Herstellung des Bodenkontaktes
- permanentes Feuchthalten bis zum Anwurzeln
- erster Schnitt so früh wie möglich – bei maximal 8 cm Wuchshöhe

Auszug aus den Lieferbedingungen für Fertigrasen

Bis zu 5 % Bruch und Austrocknung sind bei Fertigrasen möglich und gehen zu Lasten des Käufers. Eventuelle Mängel oder Mindermengen sind innerhalb 24 Stunden per Fax oder telefonisch anzuzeigen.



Ausbringung von Starterdünger vor der Verlegung



Verlegung des Fertigrasens im Verbund auf angefeuchtetes Planum, ohne dieses zu betreten



Andrücken des Rasens mit einer Walze zur Herstellung des Bodenkontaktes



Umgehende Wässerung direkt nach der Verlegung

F 1 BUGA® Sportrasen

- unsere Empfehlung für Sportplätze
- hoher Anteil an Wiesenrispe (Scherfestigkeit)
- hohe Wasserdurchlässigkeit durch sandigen Boden
- Ansaat nach RSM 3.1

Auswahlkriterien

| | |
|--|---|
| Verwendung | Sportplätze, strapazierte Hausgärten, Schwimmbäder Abschläge auf Golfplätzen sonstige intensiv genutzte Rasenflächen |
| Rasenqualität | dichtnarbig, mittelgrün, mittelbreites Blatt |
| Belastbarkeit | sehr hoch besonders trittverträglich hohe Scherfestigkeit |
| Anzuchtboden | sandige, wasserdurchlässige Böden nach DIN 18035/4 |
| Ansaat | Lolium perenne und Poa pratensis, mit Festuca rubra trichophylla |
| Pflegeaufwand | mittel bis hoch je nach Nutzung und Anspruch |
| Empfohlene Nachsaatmischung | S 321 – Regenerationsmischung mit Poa pratensis |

F 2 Gebrauchsrasen – Spielrasen

- unsere Empfehlung für Hausgärten
- feinblättriger Aspekt durch Rotschwengel-Anteile
- gute Wasserdurchlässigkeit
- Ansaat nach RSM 2.3

Auswahlkriterien

| | |
|--|---|
| Verwendung | weniger strapazierte Hausgärten, Repräsentationsflächen öffentliche Grünflächen Fairways auf Golfplätzen |
| Rasenqualität | dichtnarbig, mittelgrün, mittelfeine Blattstruktur |
| Belastbarkeit | mittel trittverträglich eingeschränkte Scherfestigkeit |
| Anzuchtboden | sandig-humose Anzuchtböden |
| Ansaat | Lolium perenne und Poa pratensis, mit Festuca rubra trichophylla zu ungefähr gleichen Anteilen |
| Pflegeaufwand | mittel |
| Empfohlene Nachsaatmischung | 2302 – Regenerationsmischung für Hausgarten |

F 4/44* Fertigrasen für Schattenlagen

- unsere Empfehlung für alle beschatteten Hausgärten
- hohe Anteile an Poa supina
- in Schattenlagen stets regelmäßige Nachsaat einplanen (z. B. im Frühjahr vertikutieren, düngen, nachsäen)
- besonders für den Einsatz von Mährobotern geeignet

Auswahlkriterien

| | |
|------------------------------------|--|
| Verwendung | Hausgärten mit beschatteten Flächen verträgt auch volle Besonnung öffentliche Grünflächen mit Beschattung Abschläge / Fairways auf Golfplätzen |
| Rasenqualität | dichtnarbig, hell- bis mittelgrün, mittelfeine Blattstruktur |
| Belastbarkeit | hoch, trittverträglich mittlere Scherfestigkeit |
| Anzuchtboden | F 4 – sandige, wasserdurchlässige Böden nach DIN 18035/4 F 44 – humos / leicht bindig |
| Ansaat | Lolium perenne, Poa pratensis, Festuca rubra trichophylla, Poa supina |
| Pflegeaufwand | mittel bis hoch je nach Anspruch ACHTUNG! Poa supina benötigt |
| Empfohlene Nachsaatmischung | 2301 – Regenerationsmischung für Schattenlagen |

* Nicht immer verfügbar – bitte fragen Sie nach.

F 8* Rustica

- der etwas andere Rasen mit mediterranem Charakter
- **sehr gut trockenheitsverträglich**
- büstenähnliche, relativ breitblättrige Struktur

Auswahlkriterien

| | |
|------------------------------------|--|
| Verwendung | Bolzplätze ohne Beregnungsmöglichkeit Hausgärten, Bunkeranten auf Golfplätzen |
| Rasenqualität | dichtnarbig, dunkelgrün (in der Vegetationszeit), helle Winterfarbe, breites Blatt, sehr tiefes Wurzelsystem |
| Belastbarkeit | trittverträglich hohe Scherfestigkeit |
| Anzuchtboden | sandige, wasserdurchlässige Böden gemäß DIN 18035/4 |
| Ansaat | Festuca arundinacea und Poa pratensis |
| Pflegeaufwand | mittel bis hoch je nach Nutzung und Anspruch ACHTUNG! Dieser Rasen braucht unbedingt sehr spät im Jahr (ca. November) noch eine Düngung, auch mit Stickstoff |
| Empfohlene Nachsaatmischung | 3103 Rustica |

* Nicht immer verfügbar – bitte fragen Sie nach.

HN 1 Holznägel

Maße 20 x 10 x 200 mm

- Befestigungsmaterial bei Verlegung von Fertigrasen an Böschungen
- Buchenholz, unbehandelt
- dadurch kein Einbringen von unverrottbaren Bestandteilen
- leicht einzuschlagen





FACHINFORMATION

Erfahrung
Service
Qualität

| | |
|---------------------------|--------|
| Rasentypen – RSM | S. 117 |
| Pflanzenbestand, Standort | S. 118 |
| Saatgutqualität | S. 120 |
| Neuanlage | S. 122 |
| Rasenpflege | S. 124 |
| Fremdarten | S. 128 |
| Rasenkrankheiten | S. 131 |
| Gräserarten | S. 137 |
| Sortenübersicht | S. 141 |

Jährlich veröffentlicht die Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau e.V. (FLL) die **Regel-Saatgut-Mischungen Rasen (RSM)** und reagiert damit sowohl auf neue wissenschaftliche und praktische Erkenntnisse als auch auf die schwankenden Saatgutverfügbarkeiten.

Für die vier nachfolgend aufgeführten **Rasentypen** (DIN 18917) werden hinsichtlich der unterschiedlichen Anwendungsbereiche und Standortverhältnisse verschiedene Mischungen erarbeitet, welche immer dem aktuellen Erkenntnisstand entsprechen und bei fachgerechter Aussaat und Pflege den besten Begrünungserfolg versprechen.

Charakterisierung der verschiedenen Rasentypen

| <i>Rasentyp</i> | <i>Anwendungsbereich</i> | <i>Eigenschaften</i> | <i>Pflegeansprüche</i> |
|------------------------|---|---|--|
| Zierrasen | Repräsentationsgrün, Hausgärten | geringe Belastbarkeit, dichte, teppichartige Narbe aus feinblättrigen Gräsern | hoch bis sehr hoch |
| Gebrauchsrasen | öffentliches Grün, Wohnsiedlungen, Hausgärten, u.a. | mittlere Belastbarkeit, widerstandsfähig gegen Trockenheit | gering bis mittel |
| Sport-/Strapazierrasen | Sportplätze, Spielplätze, Liegewiesen, Parkplätze | hohe Belastbarkeit (ganzjährig) | mittel bis sehr hoch (je nach Belastung) |
| Landschaftsrasen | extensiv genutzte Flächen im innerstädtischen Bereich | geringe Belastbarkeit, hoher Erosionsschutz, widerstandsfähig gegen Trockenheit | gering |

Entscheidend für die Wahl der richtigen Mischung sind:

- Anwendungsbereich
- Standort
- Pflege

Das Ergebnis:

- Funktionale Begrünung
- zufriedene Kunden
- schnelle Abnahme

Pflanzenbestand

Ein Pflanzenbestand wird durch verschiedene biotische und abiotische Faktoren maßgeblich beeinflusst und kann sich in seiner Zusammensetzung sowohl im Laufe seiner Entwicklung (von der Ansaat bis zu einem etablierten Bestand) als auch in den Hauptnutzungsjahren infolge einer Änderung der Faktoren (Pflege, Nutzung) verändern.

Biotische Umweltfaktoren

Konkurrenz zwischen den bzw. innerhalb der Arten um Standraum, Licht, Wasser und Nährstoffe.

Symbiose (Stickstoffbindung und Bereitstellung durch Knöllchenbakterien der Leguminosen).

Parasitismus und Krankheitsereignisse können sowohl positiv als auch negativ auf Bestände einwirken.

Empfohlene Ansaatmenge, unterschiedliche Ansprüche

Eigenschaften der Gräserarten:

- Wasserbedarf (s. ab Seite 124)
- Krankheitsanfälligkeit (s. ab Seite 131)
- Schnitt- und Trittbelastbarkeit

Abiotische Umweltfaktoren

Umweltfaktoren wie Standort, Klima und Boden Nährstoffbereitstellung, Schadstoffe im Boden Pflegemaßnahmen und Nutzung

Standort – Klima

Licht: Gräser benötigen, wie alle Pflanzen, für ihr Wachstum Licht. Einige Rasengräser wie zum Beispiel *Poa supina* weisen eine erhöhte Toleranz gegen reduzierte Lichtverhältnisse auf.

■ Schattenwurf; Exposition

Luft/Sauerstoff: Verbaute Flächen (Innenhöfe, Stadien) behindern die Luftzirkulation und damit den Gasaustausch der Pflanzen. Damit einhergehend erhöht sich meist die Gefahr von Pilzkrankheiten.

■ Bauliche Einschränkungen; Ansaatmenge (Konkurrenz)



Temperatur: Gräser beginnen oberhalb des Gefrierpunktes zu assimilieren. Nennenswertes Wachstum und Keimung tritt ab ca. 8° Celsius auf und erreicht das Optimum bei 20 – 25° Celsius. Temperaturen über 35° Celsius führen zu Schäden an/in der Pflanze.

■ **Wasser; Licht**

Wasser: Wichtig für Nährstoffaufnahme und -transport in der Pflanze. Dient der Kühlung und dem Ausgleich von Versickerung und Verdunstung.

■ **Nutzung von natürlichen Niederschlägen und/oder Beregnung; Boden, Pflanzenbestand**

Exposition: geneigtes Gelände erhöht die Gefahr der Erosion durch Wasser und Wind. Südhänge neigen zur Austrocknung, Nordhänge werden beschattet.

■ **Relief, Erosionsschutz; Wasser, Licht**



Boden

Böden mit hohen Feinanteilen verschlämmen schnell durch Niederschläge oder Bewässerung, sandige Böden haben dagegen eine geringe Speicherfähigkeit für Wasser und Nährstoffe.

Ein „**bodennaher**“ **Aufbau** orientiert sich in seiner Zusammensetzung an der vorhandenen Bodenstruktur und wird mit Zusatzstoffen wie z. B. Sand und/oder Bodenhilfsstoffen optimiert (**Bodenverbesserung**).

Eine **Rasentragschicht**, wie in der DIN 18035 Teil 4 beschrieben, oder ein Tragschichtaufbau nach USGA (amerikanische Norm) wird künstlich hergestellt und stellt immer einen Kompromiss hinsichtlich Wasserspeicherfähigkeit und -durchlässigkeit dar.

Siebkornlinie; Wasserspeicherung, -durchlässigkeit, Nutzungsintensität

DIN 18035, Teil 4:

Definiert u. a. Anforderungen für Rasentragschichtgemische auf Sportplätzen

- org. Substanz 1 bis max. 2 %
- pH-Wert 5,5 – 7,0
- Kalkgehalt möglichst gering

Der Kauf von Saatgutmischungen ist Vertrauenssache! Den wirklichen Wert einer Saatgutmischung können nur gründliche und aufwändige Untersuchungen belegen.

JULIWA-HESA verwendet hochwertigste Partien, deren Qualität fortlaufend überwacht wird.

Beste, topaktuelle Sorten in einer gezielt zusammengesetzten Mischung ermöglichen eine schnell und vollständig begrünte Fläche, vermeiden Nacharbeiten und bringen zufriedene Kunden!

Die wichtigsten Punkte zur Saatgutqualität:

Genetische Qualität:

Die Pflanzenzüchtung entwickelt sich permanent weiter! Die Züchtung einer neuen Sorte ist aufwändig und teuer. Dabei steht die Selektion nach den für Rasengräser wichtigen Eigenschaften im Vordergrund:

- Keimdauer
- Blattfeinheit
- Schnittverträglichkeit
- geringe Wüchsigkeit
- Krankheitsresistenz
- Konkurrenzkraft
- Narbendichte
- Belastbarkeit
- geringer Schnittgutanfall
- Trockenheitstoleranz
- Ausdauer
- Narbenfarbe
- Regenerationsvermögen
- sauberes Schnittbild
- Winterhärte

Bis eine Sorte geprüft, zugelassen, vermehrt wird und auf den Markt kommt, vergehen 12 bis 15 Jahre.

Technische Qualität:

Reinheit: hoher Reinigungsaufwand zur Bereitstellung von sehr guten Chargen erhöhen den Preis, aber auch die Qualität der einzelnen Chargen.

Keimfähigkeit: Nach den heutigen gesetzlichen Grundlagen muss eine Saatmischung eine Mindestkeimfähigkeit von 75 bis 80 % aufweisen. Qualitätsmischungen von JULIWA-HESA weisen eine wesentlich höhere Keimfähigkeit auf.



Lolium perenne



Poa pratensis



Agrostis stolonifera

Nutzen Sie Ihre Vorteile

- Qualitativ hochwertige Mischungen ermöglichen beste Bestände.
- Hohe Krankheitsresistenzen der Sorten bewirken dichte, gesunde Bestände, die auch Stressphasen gut überstehen können.
- Belastbarkeit und Regenerationsfähigkeit der Gräser reduzieren Folgekosten (Nachsaat).



Eingesäte Fläche nach ca. 2 Wochen



Gewünschtes Endergebnis

Zusammensetzung einer Mischung

Wir stehen in engem Kontakt mit allen wichtigen Züchtern und informieren uns ständig über neue Entwicklungen. Unsere Mischungen zeichnen sich durch fachlich korrekte und praktikable Zusammensetzungen aus. Anhand von ständigen Beobachtungen der Entwicklungen im praktischen Einsatz werden diese immer wieder angepasst.

| | Mischung I | Mischung II |
|------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Keimfähigkeit | 78 % | 90 % |
| Reinheit | 90 % | 98 % |
| Gelieferte Menge | 10 kg | 10 kg |
| Preis je kg | 5,00 € | 5,50 € |
| Preis je 10 kg Sack | 50,00 € | 55,00 € |
| Scheinbar gespart | 12 % | |
| Keimfähiges und reines Saatgut | 7,0 kg | 8,8 kg |
| Tatsächlicher Preis | 50,00 €/7,0 kg = 7,14 €/kg | 55,00 €/8,8 kg = 6,25 €/kg |
| Ihre tatsächliche Ersparnis | | 8,8 % |

Bodenvorbereitung

Bei der Bodenvorbereitung einer neu anzulegenden Rasenfläche muss mit größter Sorgfalt gearbeitet werden. Fehler, die hierbei entstehen, können später nur mit großem Aufwand beseitigt werden.

Eine tiefgründige Lockerung ist bei Staunässeproblemen angeraten. Überdenken Sie die Be- bzw. Entwässerung (Drainage) der Fläche. Grundsätzlich unterscheidet sich die Vorbereitung einer Fläche nicht bei abschließender Verwendung von Ansaatmischungen oder Fertigrasen.

Planum vorbereiten

Durch eine Bearbeitung mit Fräse oder Kreiselegge auf ca. 15 cm Tiefe wird ein feinkrümeliges Saatbeet vorbereitet. Grobe Unebenheiten werden ausgeglichen, Steine und Unrat entfernt.

Auf extrem schweren Böden (Lehm/Ton) erfolgt eine Bodenverbesserung durch Zugabe von Sand und/oder speziellen Bodenhilfsstoffen.

Wir empfehlen hier z.B. D 4 BUGA® Mycostart – Bodenaktivator mit einer Aufwandmenge von 100-200 g/m².

Anschließend wird die Fläche sauber planiert und durch Walzen rückverdichtet.



Grunddüngung

Um eine optimale Entwicklung zu ermöglichen, empfiehlt JULIWA-HESA eine Grunddüngung vor einer Ansaat bzw. dem Verlegen von Fertigrasen.

Spezielle Rasendünger und eine Einarbeitung in die oberen 2 – 3 cm des Bodens minimieren Schäden an den Keimlingen, verbessern die Wurzelbildung und beschleunigen die Anfangsentwicklung einer Rasenfläche.

- Organisch: D4 BUGA® Mycostart
Nährstoffgehalte 4-3,5-2
Aufwandmenge ca. 200 g/m
- Org.-mineralisch: D2 BUGA® Spezial
Nährstoffgehalte 12-4-8 (-3)
Aufwandmenge ca. 100 g/m
- Mineralisch: GR Multigreen Starter
Nährstoffgehalte 23-24-10
Aufwandmenge ca. 25 g/m

Die Grunddüngung erfolgt nach dem Fräsen der Fläche, danach werden nochmals Unebenheiten ausgeglichen. Zum Abschluss wird leicht gewalzt (max. 150 kg/Meter Arbeitsbreite).

Ansaat

Rasensaatgut muss auf Grund der geringen Korngröße möglichst flach im Boden abgelegt werden. Eine Ablage von ca. 0,5 – 1,5 cm ist optimal, da das Saatgut geschützt liegt und durch den Bodenkontakt die Versorgung mit Wasser verbessert wird. Zu tiefe Ablage verlängert die Zeitdauer deutlich, bis das Keimblatt die Bodenoberfläche erreicht. Die Ablage auf der Oberfläche führt zu besonders schneller Austrocknung des Saatgutes und birgt zudem die Gefahr des Abtragens durch den Wind.

- Saatgut vor der Verwendung sorgfältig durchmischen und die empfohlene Ansaatmenge beachten.
- Eine Handansaat erfordert viel Übung, besser ist die Verwendung von Streuwagen oder Rasenbaumaschinen.
- Um die Ausbringung zu optimieren, empfiehlt es sich, mit zwei räumlich versetzten Arbeitsgängen und jeweils der halben Ansaatmenge zu arbeiten.
- Eine Beimischung von trockenem Sand bzw. Saathilfe (Sojaschrot, Maisschrot) ist bei geringen Saatstärken sehr empfehlenswert.

Bewässerung

Eine Beregnung dient der Gewährleistung von optimalen Keimbedingungen aller (früh und spät keimenden) Arten. Dabei sollten örtliche Gegebenheiten einbezogen werden. Schattige Bereiche sind weniger von Austrocknung betroffen als besonnte. Besonders beachtet werden müssen Randbereiche, die z. B. an Raseneinfassungen liegen, da diese sich bei Besonnung stark erhitzen können und der Beton Wasser zieht.

- Ein Austrocknen der Keimlinge führt zu einem unwiderruflichen Absterben!
- Optimale Entwicklungsbedingungen müssen bis zu einem Deckungsgrad von 70 – 80 % erhalten werden, da das Wurzelsystem noch nicht vollständig ausgebildet ist.
- Einsaaten in den ersten 3 – 4 Wochen stets feucht halten! (an heißen trockenen Tage teilweise mehrmals täglich gleichmäßig beregnen und nie austrocknen lassen)
- Fertigrasen bis zum Anwachsen (Sode lässt sich nicht mehr abheben) täglich mit ca. 10 – 20 l/m² beregnen, bei heißer Witterung ebenfalls auf mehrere Gaben tagsüber verteilt.
- Wassermangel zeigt sich allgemein zuerst durch ein Einrollen und später durch ein Absterben der Blätter.

Erster Schnitt:

Je nach Wüchsigkeit der Fläche erfolgt bei Frühjahrs- und Sommeransaat der erste Schnitt nach ca. 4-6 Wochen oder bei 8-10 cm Wuchshöhe. Danach ist die Schnittfrequenz der Entwicklung einer Fläche anzupassen. Regelmäßiges Mähen führt zu schnellerem Narbenschluss.

Bewässerung

Pflanzen bestehen zu 75 bis 90 % aus Wasser. Bereits eine geringe Abnahme des Wassergehalts kann zum Absterben der Pflanze führen. Wasser nimmt deshalb eine zentrale Rolle im Wachstum und in der Entwicklung von Pflanzen ein. Niederschläge und damit einhergehend der Wasservorrat im Boden decken meist nicht über die gesamte Vegetationsperiode den Wasserbedarf einer Rasenfläche. Deshalb sollte bei der Pflege von Rasenflächen ein zusätzlicher Beregnungsbedarf bzw. eine optimale Ausnutzung von Wasser gewährleistet werden.

Wasserbedarf: Während in der Anfangsentwicklung „nur“ optimale Keim- und Entwicklungsbedingungen durch ein ständiges Feuchthalten der Fläche erhalten werden, gestaltet sich die Versorgung einer etablierten Rasenfläche differenzierter.

Wasser wird größtenteils über die Wurzeln aufgenommen. Ein gesundes und tiefreichendes Wurzelsystem bildet daher sowohl für die Aufnahme als auch für die optimale Ausnutzung von Wasser die zentrale Grundlage.

Der **durchschnittliche Wasserbedarf einer Rasenfläche** kann in Abhängigkeit der eingesetzten Gräser, Witterung, Boden, Belastung, Schnitthöhe und Nährstoffversorgung mit ungefähr 10 mm/Tag veranschlagt werden.



In der Regel überstehen Gräser zeitlich begrenzte Trockenereignisse ohne größere Schäden. Verschiedene Faktoren können die Austrocknung zusätzlich verzögern:

- Tiefreichendes Wurzelsystem
- Verkleinerung der Transpirationsfläche (Einrollen bzw. Falten der Blätter)
- Verdickung der Kutikula (Wachsschicht)
- Schließung der Stomatazellen (z. B. durch gute Kalium-Versorgung)

Langfristiger Austrocknung begegnen Gräser mit zwei verschiedenen Strategien:

- **Flucht:** Abschluss des Lebenszyklus – zeigt sich durch Blütenstandsbildung (Notblüte) und beschleunigte Samenreife (z. B. *Poa annua*).
- **Dormanz:** Überdauern in einem Ruhestadium; Ist mit optischen Mängeln verbunden, die Pflanzen regenerieren sich jedoch bei Wasserzufuhr wieder.

Achten Sie schon bei der Ansaat einer sommertrockenen Fläche auf die Wahl der richtigen Mischung, den Rasentyp und die Bedürfnisse der einzelnen Gräser.

Eigenschaften der Gräserarten in Bezug auf Wasserbedarf in der Reihenfolge gering bis hoch:

Festuca ovina/trachyphylla – *Festuca rubra* – *Poa pratensis* – *Lolium perenne* – *Festuca arundinacea* – *Agrostis* ssp. - *Poa annua* – *Poa supina*

Tägliche kleine Wassergaben fördern flachwurzelnde Arten (z. B. *Poa annua*), große Mengen (10 – 15 l/m²) in mehrtägigen Intervallen fördern den Wurzeltiefgang und damit das für die Gräser erschließbare Bodenvolumen.

Schnitt

■ Grundregeln:

Achten Sie stets auf einen sauberen Schnitt mit scharfen Messern!

Nie mehr als 30 – 50 % der Wuchshöhe entfernen!

(Ein-Drittel-Regel)

Wenn möglich bei einer Höhe von maximal 7 – 8 cm mähen.

Bei Sport- und Spielrasen ist eine Zielschnitthöhe von 3 – 4 cm ideal.

Je tiefer die Zielschnitthöhe ist, desto öfter und regelmäßiger muss geschnitten werden.

Regelmäßiger Schnitt ist eine der wichtigsten Grundlagen für eine dichte Grasnarbe!

■ Die wichtigsten Mähgeräte:

Sichelmäher sind günstig, robust und auch für größere Wuchshöhen geeignet.

Nachteil: Das Schnittbild ist durch die rotierenden (schlagenden) Messer nicht so sauber (Förderung von Pilzinfektionen, erhöhter Wasserverlust der Pflanze), niedrige Schnitthöhen (< 2,5 cm) sind nur schwer erreichbar.

Spindelmäher erreichen niedrigste Schnitthöhen mit einem sehr sauberen Schnittbild. Das Gras wird wie bei einer Schere mit Schneide und Gegenschneide abgeschnitten.

Nachteil: teuer, pflege- und wartungsaufwändig und für größere Wuchshöhen nicht geeignet.

Mulchmäher zerkleinern mit speziellen Werkzeugen das Schnittgut, das auf der Fläche verbleibt. Die Nährstoffrückführung kann in den Düngeplan einberechnet werden (maximal eine Düngung/Jahr kann eingespart werden).

Nachteil: Gefahr der Filzanreicherung bei zu trockener oder zu feuchter Witterung, Erhöhung der Pilzinfektionsgefahr

■ Schnittgut:

Schnittgut darf nur bei geringem Aufwuchs, optimal zerkleinert und fein verteilt auf der (mikrobiologisch aktiven) Fläche verbleiben. Der Nährstoffzug durch ein Absammeln von Schnittgut muss bei der Düngung einkalkuliert werden.



Regelmäßiger Schnitt ist eine der wichtigsten Grundlagen für eine dichte Grasnarbe.

Düngung

Immer der Nährstoff, der im Minimum vorliegt, begrenzt das Wachstum der Pflanze. Ist also ein bestimmter Nährstoff nicht ausreichend vorhanden, so wächst die Graspflanze nicht optimal – auch, wenn die übrigen verfügbaren Nährstoffe den Bedarf decken können.

Düngung sollte generell nach Bodenanalyse, Rasentyp, Nutzung und Pflege bedarfsgerecht gestaltet werden. Verbleibendes Schnittgut sollte ebenso wie die Nährstoffnachlieferung aus dem Boden einbezogen werden.

Hauptnährstoffe:

N, Stickstoff: Wichtigster Grundnährstoff als Baustein für Proteine und Enzyme; Aufnahme als Ammonium- oder Nitration. Mangel führt zu blass-grüner Färbung, chlorotischen Blättern und reduziertem Wachstum. Überschusssymptome sind weiches Gewebe und gesteigerte Krankheitsanfälligkeit.

P, Phosphor: essentieller Baustein der Energieträger und Proteine, Aufnahme als Phosphation. Starke Festlegung im Boden, geringe Aufnahme durch die Pflanzen bei zu niedrigem/hohem pH-Wert. Erhöhung der Frostbeständigkeit. Wichtig für die Wurzelentwicklung der Gräser (*daher hoher Gehalt im Starterdünger*) – für die Anwendung bei Neuanlage und Regeneration.

K, Kalium: Enzymtätigkeit, regelt entscheidend den osmotischen Druck in der Pflanzenzelle und reguliert dadurch den Wasserhaushalt. Aufnahme als Kaliumion, auswaschungsgefährdet in leichten Böden. Ausreichend mit Kalium versorgte Pflanzen sind widerstandsfähiger gegenüber Stress (Belastung, Trockenheit, Kälte und Krankheiten).

Mg, Magnesium: Bestandteil des Chlorophylls (Photosynthese), sehr beweglich innerhalb der Pflanze. Mangel führt zu Chlorosen und Verfärbungen der Blätter.

Ca, Calcium: Zellwandstabilisierung, verbreiteter Baustein, erhöht den pH-Wert im Boden.

Spurennährstoffe:

Fe, Eisen: Chlorophyllbildung und Enzymreaktion, geringe Verfügbarkeit bei hohem Boden pH-Wert. Mangel zeigt sich in Streifenchlorose der Blätter

Cu, Kupfer / Zn, Zink: Bestandteile von Enzymen zur Wuchs- und Chlorophyllbildung, Mangel führt zu Chlorosen und Absterben der Knospen.

S, Schwefel: Baustein für Aminosäuren und Vitamine, Aufnahme als Sulfation

Mn, Mangan: Katalysator für viele Enzymreaktionen, besonders wichtig in Stresssituationen. Mangel führt zu erhöhter Anfälligkeit gegenüber Krankheiten und Stressfaktoren. Er äußert sich in Wachstumsanomalien und Nekrosen.

Si, Silicium: Strukturelement in Zellwänden. Dadurch wird u.a. pilzlichen Schaderregern das Eindringen erschwert.

Düngerarten

- **Mineralische Dünger** – leichtlöslich, schnell wirkend.
GMV Multigreen Multiverdo 12-0-42 (-2)
- **Organische Dünger** – Langzeitwirkung durch Umsetzungsprozesse, aufgrund humusfördernder Wirkung auf künstlichen Bodenaufbauten nur eingeschränkt geeignet.
D 4 BUGA® Mycostart – Bodenaktivator
(mit lebenden Mykorrhiza-Pilzen)
- **Organisch-mineralische Dünger** – durch die Kombination von nicht wasserlöslichen Nährstoffen mit mineralischen Salzen wird eine Sofort- und Langzeitwirkung erzielt.
D 2 BUGA® Spezial 12-4-8 (-3)
D 3 BUGA® Minikon 12-4-8 (-3)
D 5 BUGA® Herbst 6-3-18 (-3)
D 7 BUGA® Vegalin 8-4-8 (-3)
- **Mineralische Dünger mit Langzeitwirkung** – gezielte Versorgung mit Nährstoffen über einen längeren Zeitraum von bis zu 6 Monaten. Die Stickstoffformen Nitrat und Ammonium sorgen für die kurzfristige, freier Harnstoff für die **mittelfristige und umhülltes Kaliumnitrat/Harnstoff oder Methylenurea für die langfristige Nährstoffversorgung der Pflanzen.**




Multigreen-Greenpower-Dünger

- Von links nach rechts:
- Kaliumnitrat löslich
 - teilumhüllt
 - komplett umhüllt

Generell werden Ein- und Mehrnährstoffdünger in unterschiedlichen Zusammensetzungen, mit und ohne Spurennährstoffe unterschieden. Wichtig ist weniger der absolute Nährstoffgehalt als das Verhältnis vor allem der Hauptnährstoffe zueinander.

Im Frühjahr sollte das Verhältnis der Nährstoffe Stickstoff (N) und Kalium (K) 3:1 betragen, im Sommer 1:1 und im Herbst 1:3.

Weiter werden die Dünger nach der Wirkungsdauer eingeteilt, was insbesondere für den Hauptnährstoff Stickstoff von großer Bedeutung ist.



Unerwünschte Tiere

■ Ameisen:

Keine eigentliche Schadwirkung auf Gräser!

Verstärktes Auftreten in sandigen Böden.

Düngung mit schwefelsaurem Ammoniak, Abkehren der Ameisenhügel, häufiges starkes Wässern der Fläche führt zur Vergrämung.

■ Engerlinge / Tipula-Larven:

Vergilben und Absterben der Gräser durch Fraß an den Wurzeln.

Sekundärschäden durch Vögel.

Einsatz von parasitierenden Nematoden, Bacillus thuringiensis (Zulassungssituation beachten!)

■ Regenwürmer:

Verstärktes Auftreten in lockeren, humosen Böden.

Optische Mängel und Spielbeeinträchtigung durch Kothäufchen.

Besanden, saure Düngung. Nur eine Reduktion der Population möglich. Keine chemische Bekämpfung erlaubt!

■ Maulwürfe:

Wühlgänge und (vertikal) aufgeworfene Erdhaufen.

Geschützte Art, darf nicht bekämpft werden!

■ Wühlmäuse:

(meist flach verlaufende) Wühlgänge und (seitlich) aufgeworfene Erdhaufen.

Aufstellen von Fallen, Begasung, Vergrämung durch Ultraschall.



Tipula-Larve



Maulwurf / Wühlmaus

Unerwünschte Pflanzen

■ Moos:

Meist im Schatten, bei niedrigem pH-Wert und zu geringer Nährstoffversorgung treten Moose als grün-bräunliche Schicht auf. Diese kann die Gräser verdrängen.

Bekämpfung: Vertikutieren, Material abfahren und mit geeigneter Mischung nachsäen (z. B. 25 g/m² 2301 Regeneration für Schattenlagen oder BUGA® Nr. 5 – Schattenrasen).

Wichtig: Ursachen beseitigen! Optimale Pflege beugt dem Eindringen von Moos vor.



Moos

■ Poa annua:

Saatgut ist überall vorhanden und keimt in Lücken; vor allem auf verdichteten und feuchten Böden (Trittpflanze). Geringe Scherfestigkeit, Absterben und später Lücken durch geringen Wurzeltiefgang sind die Folgen. Optische Mängel durch helle Farbe. Spieltechnische Einschränkungen durch ständige Blütenbildung (auch bei geringer Schnitthöhe).

Bei Ansaaten für schnellen Lückenschluss sorgen. Entstehende Lücken durch Beanspruchung (Sportflächen) durch Förderung der erwünschten Gräser schnell schließen. Bewässerung in großen Intervallen, um die Poa annua Pflanzen auszutrocknen.



Poa annua

■ Zweikeimblättrige Wildkräuter:

Einjährige Ackerunkräuter wie Hirtentäschel oder Melde, mehrjährige wie vor allem Löwenzahn, Wegerich und Ehrenpreis. Die Ursache liegt meist im lückigen Rasenbestand und/oder einer unzureichenden Nährstoffversorgung der Rasengräser.

Typische „Rasenkräuter“ wie Löwenzahn, Wegerich oder Gänseblümchen können bei vereinzelter Auftreten durch Ausstechen beseitigt werden. Anschließend folgt eine Nachsaat und Düngung.



Wegerich

■ Klee:

Tritt vermehrt bei mangelhafter Stickstoff-Versorgung einer Rasenfläche auf. Nesterweises Auftreten und dadurch Verdrängung der Gräser.

Gezielte N-Düngung führt zur raschen Reduktion. Bei starkem Befall Bekämpfung mit einem zugelassenen Herbizid, die Rhizome (Kriechtriebe) des Weißklee werden jedoch oft nicht vollständig vernichtet.



Weißklee

Unerwünschte Pflanzen

■ Algen:

bilden je nach Art einen schwarzen, grünen oder braunen gallertartigen Belag auf dem Boden. Ursachen sind zumeist ein lückiger Bestand, schlechter Wasserabfluss, Staunässe und Rasenfilz. *Abrechen des abgetrockneten, spröden Algenbelages. Filzbeseitigung (Vertikutieren), Belüften (Aerifizieren) und Besanden. Kontrolle der Drainage.*

■ Hirsearten:

In den letzten Jahren – und hier besonders in heißen und trockenen Sommern – haben sich die zur Gräsergruppe zählenden Hirsen auf Rasenflächen stark ausgebreitet. Hauptsächlich treten die Arten Bluthirse (*Digitaria sanguinalis*), Hühnerhirse (*Echinochloa crus-galli*) und Borstenhirse (*Setaria viridis*) in Erscheinung.

Die Verbreitung der ursprünglich im Maisanbau auftretenden Hirsen erfolgt hauptsächlich über Bodenabtrag bzw. Bodenzufuhr, Vögel oder den Menschen. Die Lebensdauer von Hirsesamen im Boden (Bodenvorrat) kann 7 Jahre und mehr betragen.

Wichtig: Hirsen werden nicht durch Rasensaatgutmischungen eingebracht!

Alle Hirsen sind einjährig und vertragen keinen Frost. Für die Keimung werden Bodentemperaturen von ca. 22 – 25° C benötigt. Folglich sind vor allem Neuanlagen und Regenerationsmaßnahmen in den Sommermonaten betroffen.

Eine selektive Herbizidanwendung ist nicht möglich!



Hirsearten

Vorbeugung gegen Hirsebefall:

- Der Boden von Problemflächen sollte insbesondere bei Sommeransaat flach bearbeitet und möglichst offen gelassen werden.
- So kann die zunächst keimende Hirse durch eine nochmalige flache Bearbeitung oder durch ein Totalherbizid entfernt werden.
- Damit keine neuen Samen an die Oberfläche gelangen, darf keine tiefere Bodenbearbeitung stattfinden.

Bestehende Flächen:

- Dichte, konkurrenzstarke Bestände werden kaum von Hirse befallen
- Regelmäßiger Schnitt, ausgewogene Düngung
- Schnitt vor der Blüte/Samenreife und Abfuhr des Schnittgutes
- Mehrmalige, intensive Bewässerung mit einer ausreichenden Menge, da Hirsen trockene Standorte bevorzugen

Einjährige Ungräser niemals zur Samenreife kommen lassen. Gräser fördern und Lücken schließen. An- / Nachsaaten nicht im Sommer durchführen. Im Herbst und spätestens im Folge-Frühjahr einen hohen Deckungsgrad der Rasenfläche erzeugen (keine Narbenschäden, optimaler Versorgungsgrad der erwünschten Rasengräser, regelmäßiger Schnitt in angepasster Höhe).

Rasenkrankheiten – Allgemeines

Als Pflanzenkrankheit ist der Befall mit einem Schadorganismus zu verstehen. Jedoch sind auch noch weitere Ursachen in Betracht zu ziehen. Zu diesen, die Anfälligkeit der Pflanzen für Infektionen beeinflussenden Faktoren, gehören:

■ Licht:

Durch Lichtmangel werden Bestandesdichte und Konkurrenzkraft reduziert.

■ Temperatur:

Höhere Temperaturen fördern Vitalität und Aktivität der Pflanze, zu niedrige senken die Stoffwechselaktivität.

■ Wasser:

Mangel schwächt die Pflanze und verzögert die Regeneration, Überschuss behindert die Sauerstoffversorgung der Wurzeln. Daneben begünstigen Luftfeuchtigkeit bzw. Wasser auf der Pflanzenoberfläche Pilzinfektionen.

■ Nährstoffe:

Gute K- und N-Versorgung verhindert Infektionen; eine N-Überversorgung führt zu weicherem Gewebe und damit höherer Infektionsgefahr.

Eine Herbstdüngung mit einem kaliumbetonten Rasenspezialdünger stärkt die Zellwände und erhöht die Widerstandsfähigkeit gegenüber Rasenkrankheiten.

■ Beseitigung von Tauauflagen:

(z. B. durch Abwedeln bei kleineren Flächen)

■ Sorgfältiger Schnitt:

d. h. möglichst geringe Verletzungen der Pflanzen (glatter Schnitt mit scharfen Messern, Mähen nur bei trockenem Rasen), Abräumen des Mähgutes zur Verhinderung von Neuinfektionen.

■ Licht- und windoffene Lagen:

für Rasenflächen wählen, evtl. Hindernisse beseitigen; dadurch wird auch das Mikroklima und insbesondere die Luftfeuchtigkeit beeinflusst.

■ Funktionsfähiger Aufbau:

Dadurch wird Entwässerung wie Belüftung ausreichend gewährleistet. Auftretende Verdichtungsschichten sowie Rasenfilz müssen durch geeignete Pflegemaßnahmen wie Aerifizieren, Vertikutieren, Besanden beseitigt werden.

■ Ausgewogene Düngung:

Ein Übermaß an Stickstoff muss vermieden und ausreichend Kalium zugeführt werden. Kritische Düngezeitpunkte, bei denen die Pflanzen geschädigt werden könnten sollten vermieden werden (hohe Temperaturen, Verätzungsgefahr).

ACHTUNG!

Bei der Bekämpfung von Rasenkrankheiten mit chemischen Mitteln sollten Sie beachten, dass im Laufe eines Jahres Zulassungsänderungen möglich sind. Wir empfehlen Ihnen, sich von einem Fachhändler oder dem für Sie zuständigen Pflanzenschutzdienst beraten zu lassen. Bitte beachten Sie die jeweilige Landesgesetzgebung und beantragen Sie bei Bedarf Ausnahmegenehmigungen.

Anthraknose

Colletotrichum graminicola

■ Krankheitsbild

bei feuchtwarmer Witterung größere unregelmäßige, rötlichbraune Flecken, bei kühler Witterung 1 – 3 cm große Flecken, junge Blätter gelb-orange, Lückigkeit, Wurzelfäule (Pflanzen lassen sich aus dem Boden ziehen).

■ Bedingungen

alle Faktoren, die die Pflanzen stressen (tiefer Schnitt, Hitze, Nährstoffmangel, Staunässe).

■ Maßnahmen

Stressfaktoren beseitigen, Verbesserung von Wasser- und Lufthaushalt im Boden durch mechanische Bearbeitung (Vertikutieren, Aerifizieren).

Braunfleckenkrankheit

Rhizoctonia solani

■ Krankheitsbild

unregelmäßig runde Flecken bis 1 m Durchmesser, z. T. mit 2–4 cm breitem, graublauem äußerem Ring (smoke-ring), sonst rötlich bis hellbraun, strohig.

■ Bedingungen

20 – 25° C bei gleichzeitig warmen Nächten. Wasserfilm auf den Blättern.

■ Maßnahmen

ausgewogene Nährstoffversorgung, keine schnelllöslichen N-Dünger verwenden.

Blattfleckenkrankheit

Drechslera poae (Helminthosporium)

■ Krankheitsbild

kleine, rote bis dunkelbraune Flecken mit weißem Zentrum auf den Blättern und Blattscheiden. Im Bestand Flecken mit verschwommenen Grenzen. Es kann zum Absterben ganzer Pflanzen kommen.

■ Bedingungen

feuchtes, kühles Wetter, Beschattung. Rasenfilz und Schnittgutreste fördern die Überwinterung des Erregers.

■ Maßnahmen

Übertragung durch Maschinen vermeiden, Schnittgut entfernen, Rasenfilz beseitigen, Schnitthöhe anheben, niedrige N-Düngung. Auswahl von resistenten Sorten bei der Ansaat.

Sommerfusariose

Fusarium spp.

■ Krankheitsbild

zunächst hellgrüne Flecken (5 – 15 cm Durchmesser), dann hellbraun bis gelb (60 – 100 cm Durchmesser), schwach rötliches Myzel am Rand der Flecken, dunkelbraune Verfärbung an der Triebbasis, Blattflecken.

■ Bedingungen

hohe Temperatur und hohe Lichtintensität, Staunässe, extreme pH-Werte (< 5 oder > 7), hohe N-Düngung.

■ Maßnahmen

gute P- und K-Versorgung, Schnitthöhe anheben, pH-Wert durch Düngung korrigieren.

Gelbfleckenkrankheit

Rhizoctonia cerealis

(s. a. Braunfleckenkrankheit – *Rhizoctonia solani*)

■ Krankheitsbild

helle, gelbbraune Flecken im Bestand, Wurzel- und Triebgrundinfektionen.

■ Bedingungen

unter kühleren Bedingungen (15 – 25° C).

■ Maßnahmen

ausgewogene Nährstoffversorgung, schnelllösliche N-Dünger vermeiden.

Dollarflecken

Sclerotinia homoeocarpa

■ Krankheitsbild

erst 2 – 3 cm, später 5 – 10 cm große, scharf abgegrenzte kreisrunde gelbliche Flecken; bei Tau ist das weiße Myzel deutlich sichtbar; befallene Blätter weisen oft eine charakteristische Einschnürung auf.

■ Bedingungen

hohes Infektionsrisiko an warmen Tagen (25 – 30° C) und bei mangelhafter Nährstoffversorgung, oft zu finden auf Golfgrüns mit dichter Narbe.

■ Maßnahmen

Vermeidung von Trockenstress und der Bildung von Rasenfz, ausgewogene Düngung (insbesondere Kalium), Beseitigung von Bodenverdichtungen.

Mehltau

Erysiphe graminis

■ Krankheitsbild

weiß-grauer Belag, zunächst auf den oberen Blatträndern, dann auf dem gesamten Blatt, danach Gelbfärbung und Absterben der Blätter.

■ Bedingungen

hohe Luftfeuchtigkeit bei warmen Temperaturen, hoher Schnitt, Lichtmangel, hohe N-Düngung.

■ Maßnahmen

Senkung der Schnitthöhe und regelmäßiger Schnitt, sparsame Bewässerung, N-Düngung reduzieren.



Dollarflecken

Hexenringe

Marasmius oreades u. a.

■ Krankheitsbild

entweder nur Ringe mit dunkelgrünen Wuchszonen oder Zonen mit stärkerem Graswachstum, die Streifen abgestorbenen Grasses einschließen oder nur ringförmig angeordnete Hutpilze, die das Gras nicht direkt schädigen; das im Inneren der Ringe befindliche Pilzmyzel ist stark wasserabweisend und kann zur Austrocknung des Bestands führen.

■ Bedingungen

alle Grasarten können befallen werden, es handelt sich meist um ältere Flächen, frühere Waldflächen oder stark verfilzte Bestände.

■ Maßnahmen

Durchstoßen der Myzelschicht durch Tiefenlockerung (Grabgabel), Bewässerung unter Einsatz von Benetzungsmitteln (wetting agents), Absammeln der Fruchtkörper zur Verhinderung der Verbreitung.



Hexenringe

Rostkrankheiten

Puccinia spp.

■ Krankheitsbild

zu Beginn hellgelbe Flecken auf den Blättern, dann je nach Rostart gelbe, braune oder schwarze Pusteln, die Sporen enthalten, die für die weitere Verbreitung sorgen; besonders rostanfällig ist die Wiesenrispe.

■ Bedingungen

Stress der Pflanzen durch Nährstoff-, Licht- oder Wassermangel, hohe Luftfeuchtigkeit, warme Witterung.

■ Maßnahmen

Stressfaktoren beheben (Schnitthöhe anheben, Belastung reduzieren), ausgewogene Nährstoffversorgung, Entfernung von Zwischenwirten aus der Umgebung (z. B. Berberitze).



Rost

Rotspitzigkeit

Laetisaria fuciformis (syn. *Corticium*)

■ Krankheitsbild

Kleine, unregelmäßig geformte Flecken im Bestand, die erst hellbraun, dann gelb werden; rosafarbenes, watteartiges Myzel. An den Blattspitzen bilden sich geweihartige, rote Myzelzusammenlagerungen.

■ Bedingungen

langanhaltende Feuchtigkeit (Regen, Nebel), N-Mangel.

■ Maßnahmen

Sortenwahl bei Neuanlage, gezielte N-Düngung.



Rotspitzigkeit

Schneesimmel

Microdochium nivale (syn. *Gerlachia*, *Fusarium*)

■ Krankheitsbild

wassergesättigte graue Flecken (Nassfäule) von ca. 5 cm Durchmesser, weißes bis rosafarbenes Myzel, dann Ausdehnung bis 25 cm Durchmesser, am Rand dunkel (Infektionszone); Regeneration aus der Mitte heraus (Froschaug).

■ Bedingungen

Erkrankung ist nicht an Schnee gebunden, sondern kann ganzjährig erfolgen: bei anhaltender Feuchtigkeit, Schnee auf ungefrorenem Boden, Abdeckung mit Schnittgut, hohem pH-Wert.

■ Maßnahmen

Kaliumgaben zum Herbst, Entfernen des Schnittgutes, saure Düngung, Vertikutieren im Frühjahr, um befallenes Pflanzenmaterial zu entfernen, Einsatz von Taukontrolle-Produkten (z. B. DewCure).



Schneesimmel

Schwarzbeinigkeit

Gaeumannomyces graminis (syn. Ophiobolus)

■ Krankheitsbild

Wurzeln, auch Ausläufer und Triebgrund sind schwarzbraun verfärbt; zunächst unregelmäßige Flecken im Bestand, hellbraun bis rötlich, innerhalb des Ringes wandern langfristig Unkräuter oder *Poa annua* ein.

■ Bedingungen

Rasentragschichten mit hohem Sandanteil, hoher pH-Wert in der obersten Schicht.

■ Maßnahmen

saure Düngung, Artenwahl (*Agrostis* sp. und *Poa* sp. sind sehr anfällig).

Grauer Schneeschimmel

(*Typhula*-Fäule) *Typhula incarnata*

■ Krankheitsbild

Nach der Schneeschmelze graue bis gelbbraune Flecken mit 50 – 100 cm Durchmesser, trockene, papierartige Konsistenz der Gräser (Trockenfäule), grauweißes Myzel; orange-braune, stecknadelkopfgroße Sklerotien an den Blattspreiten.

■ Bedingungen

langanhaltende Schneedecke, erhöhte N-Gaben und damit weiches Pflanzengewebe, Jungpflanzen sind anfälliger (Neuanlagen).

■ Maßnahmen

ausgewogene Düngung, Stärkung der Gräser besonders am Vegetationsende.

Wurzelfäule (Pythium-Fäule)

Pythium spp.

■ Krankheitsbild


bei Neuanlagen: Störung der Keimung, Wurzelnekrosen, Absterben der Jungpflanzen. Bei älteren Rasenflächen: Blatt- und Wurzelfäulen, graue bis rötliche Flecken im Bestand, Einzelpflanzen lassen sich ausreißen.

■ Bedingungen

hohe Tages- und Nachttemperaturen, wassergesättigter Boden, zu dichter Pflanzenbestand bei Neusaaten.

■ Maßnahmen

Nässe reduzieren, Verdichtungen beseitigen, bei Neuanlagen Saatstärke und Ablagetiefe optimal einstellen.



Grauer Schneeschimmel

Gräser-Info

Da es im Bereich Rasen, besonders bei häufigem Schnitt, nur relativ wenige relevante Gräserarten gibt, haben wir diese für Sie auf den folgenden Seite übersichtlich zusammengestellt. Dies ermöglicht Ihnen, Gräser zu erkennen und Ihre Pflegemaßnahmen darauf abzustimmen. Zur Vereinfachung sind auf dieser Seite einige Abbildungen zu den Bestimmungsmerkmalen aufgeführt. Wir stehen Ihnen gerne auch telefonisch mit Beratung zur Verfügung, digitale Fotos können ebenfalls wertvoll für eine weitere Analyse sein. Kontaktieren Sie uns einfach im Bedarfsfall – wir sind Ihnen gerne behilflich!

Wuchsformen



Stolon
(oberirdische Ausläufer)




Horst



Rhizom
(unterirdische Ausläufer)

Aufbau eines Grashalms

Jüngstes Blatt im Querschnitt



Gräserarten


Die Züchtung von Rasengräsern entwickelte sich aus der landwirtschaftlichen Nutzung. Dort standen als Qualitätskriterien Aufwuchsmenge, Rohproteingehalt und Verdaulichkeit für Tiere im Vordergrund, da das Ziel die Ernährung des Nutztieres und damit nachfolgend die menschliche Ernährung war.

Mit zunehmendem Interesse an einer Freizeitnutzung von Gräsern in Form von Rasenflächen änderten sich diese Züchtungsziele grundlegend. Im Vordergrund stehen nun geringe Wüchsigkeit, hohe Narbendichte, Strapazierfähigkeit und optische Aspekte wie Wuchsform und Farbe. Daher entwickelte sich die Gräserzüchtung in zwei unterschiedliche Richtungen.

Für eine Rasennutzung mit häufigem Schnitt und fehlender Vermehrungsmöglichkeit durch Samenbildung sind nur wenige Arten geeignet, die nachfolgend ausführlich mit den Verwendungsmöglichkeiten beschrieben werden.

Lolium perenne

Ausdauerndes Weidelgras

**Wuchsform**

Horst, bei Belastung Seitentriebebildung an Knoten möglich

Merkmale**zur Bestimmung**

jüngstes Blatt gefaltet,
Blattoberseite deutlich gerieft,
Blattunterseite stark glänzend,
Triebgrund rot-violett

Nährstoffansprüche

mittel bis hoch

Wasseransprüche

hoch, regeneriert sich jedoch nach Austrocknung sehr schnell wieder hoch

Narbendichte**Strapazierfähigkeit****Schnitthöhe**

sehr hoch, gute Wurzelrißfestigkeit
Minimum 30 mm bei starker Belastung (Sportrasen), auf Funktionsflächen des Golfplatzes 10-15 mm (Sortenunterschiede!)

Krankheiten**Verwendung**

Rotspitzigkeit und Schneeschimmel in nahezu allen Mischungen der RSM enthalten, besonders wichtig auf allen Strapazierrasenflächen, geeignet für Nachsaaten aufgrund schneller Keimung und rascher Jugendentwicklung

TKM**Keimdauer**

2 g – ca. 500 Körner / g
7 – 14 Tage

Poa pratensis

Wiesenrispe

**Wuchsform**

unterirdische Ausläufer

Merkmale**zur Bestimmung**

jüngstes Blatt gefaltet,
Blattoberseite mit Doppelrille (Skispur),
Blatt parallelrandig mit Kahnspitze,
kurzes kragenförmiges Häutchen
mittel bis hoch

Nährstoffansprüche**Wasseransprüche**

mäßig, bleibt bei Trockenheit lange grün, da die Rhizome Wasser und Nährstoffe speichern können

Narbendichte**Strapazierfähigkeit**

hoch

sehr hoch, Stabilisierung der obersten Bodenschicht durch Ausläufer, Lücken können durch Ausläufer geschlossen werden

Schnitthöhe

Minimum 20 mm bei Sportrasennutzung, auf Abschlägen und Vorgrüns 10-15 mm

Krankheiten**Verwendung**

Rost


in nahezu allen Mischungen der RSM enthalten, besonders wichtig auf allen Strapazierrasenflächen

TKM**Keimdauer**

0,3 g – ca. 3.300 Körner / g
14 – 28 Tage

Festuca rubra ssp.

Rotschwingel



| | |
|------------------------------------|--|
| Wuchsform | Festuca rubra commutata – horstbildend Festuca rubra rubra – lange unterirdische Ausläufer Festuca rubra trichophylla – kurze unterirdische Ausläufer |
| Merkmale zur Bestimmung | jüngstes Blatt borstenförmig, im Querschnitt mehrfach gekielt, Blattoberseite mit starken Riefen, Blattscheide geschlossen, untere Blattscheiden oft rötlich |
| Nährstoffansprüche | gering |
| Wasseransprüche | gering, Pflanzen brauchen nach Austrocknung jedoch lange Zeit zur Regeneration |
| Narbendichte | je nach Unterart mittel bis hoch |
| Strapazierfähigkeit | geringe Tritt- und Scherfestigkeit |
| Schnitthöhe | Minimum 5-6 mm |
| Krankheiten | geringe Anfälligkeit für gängige Rasenkrankheiten |
| Verwendung | besonders geeignet für Zierrasen (Feinblättrigkeit) und Landschaftsrasen (geringe Wüchsigkeit), Golfgrüns |
| TKM | 1,2 g – ca. 900 Körner / g |
| Keimdauer | 10 – 18 Tage |

Festuca arundinacea


Rohrschwingel



| | |
|------------------------------------|--|
| Wuchsform | Horste, z. T. unterirdische Ausläufer |
| Merkmale zur Bestimmung | jüngstes Blatt gerollt, Blattoberseite deutlich gerieft, breites Blatt, unterseits stark glänzend, Triebgrund rot-violett |
| Nährstoffansprüche | mittel bis hoch |
| Wasseransprüche | mäßig, bleibt bei Trockenheit durch das ausgeprägte Wurzelsystem lange grün |
| Narbendichte | mittel bis hoch (bei den neuen Zuchtsorten) |
| Strapazierfähigkeit | hoch, gute Stabilität der Narbe durch intensive Durchwurzelung des Bodens |
| Schnitthöhe | Minimum 30 mm bei Sportrasennutzung, ideal sind 40-45 mm |
| Krankheiten | Blattflecken, Schneeschimmel |
| Verwendung | auf strapazierten, wenig bewässerten Flächen, in teilschattigen Bereichen; sorgt besonders in Verbindung mit Wiesenrispe für eine dunkle, trag- fähige Narbe |
| TKM | 2,2 g – ca. 450 Körner / g |
| Keimdauer | 10 – 18 Tage |

Festuca trachyphylla

Schafschwingel

**Wuchsform****Merkmale****zur Bestimmung**

dichte, halbkugelige Horste
Blätter borstenförmig,
oval-elliptischer Querschnitt
blau-grüne Farbe
Blattscheide offen

Nährstoffansprüche**Wasseransprüche****Narbendichte****Strapazierfähigkeit**

sehr gering
sehr gering
mittel
wenig belastbar, verträgt Tritt
sehr schlecht

Schnitthöhe**Krankheiten****Verwendung**

Minimum ca. 30 mm
geringe Anfälligkeit
besonders geeignet für Landschafts-
rasen (niedrige Ansprüche und
Wüchsigkeit)

TKM**Keimdauer**

1,0 g – ca. 1.000 Körner/g
11 – 20 Tage

Agrostis stolonifera

Flechtstraußgras

**Wuchsform****Merkmale****zur Bestimmung**

oberirdische Ausläufer
Jüngstes Blatt gerollt
Blattoberseite deutlich gerieft
deutliches weißes Häutchen
je nach Nutzung mittel bis sehr
hoch

Nährstoffansprüche**Wasseransprüche****Narbendichte****Strapazierfähigkeit****Schnitthöhe****Krankheiten****Verwendung**

sehr hoch
hoch bis sehr hoch
gering, wenig scherfest
auf Grünflächen bis 3 mm
hohe Anfälligkeit für
Dollarflecken, Ophiobolus, u.a.
Einsatz normalerweise nur auf
dem Golfplatz (Grünflächen),
hoher Pflegeaufwand, da
Neigung zur Filzbildung, vertikale
Bearbeitung wie Schlitzen und
Vertikutieren permanent
erforderlich

TKM**Keimdauer**

0,045 g – ca. 18.000 Körner/g
10 – 18 Tage


Auszug aus unserem Sortenprogramm

| Grasart Sorte | Einstufung nach RSM 2023 | | | | |
|-----------------------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| | Zier- rasen | Gebrauchs- rasen | Strapa- zierrasen | Tiefschnitt- rasen | Land- schaftsr. |
| Agrostis capillaris | | | | | |
| Barking | 7 | 8 | | 7 | 7 |
| Heriot | 7 | 7 | | 8 | 8 |
| Highland | | 6 | | | 6 |
| Polana | 8 | 9 | | 8 | 7 |
| Agrostis stolonifera | | | | | |
| Cobra Nova | Spitzensorte in USA | | | | |
| Independence 1 | 8 | | | 9 | 7 |
| L93 XD | Spitzensorte in USA | | | | |
| Prestige Premium Blend | Blend aus 2 USA-Sorten | | | | |
| Festuca arundinacea | | | | | |
| Amarello | | 7 | 7 | | |
| Debussy 1 | | 6 | 7 | | |
| Regenerate | | 9 | 8 | | |
| Festuca rubra commutata | | | | | |
| Annalena | 8 | 8 | | 8 | 7 |
| Greenmile | 8 | 8 | | 8 | 7 |
| Mission | 8 | 8 | | 8 | 6 |
| Festuca rubra rubra | | | | | |
| Dipper | 6 | 6 | | | 6 |
| Maxima I | 5 | 5 | | | 5 |
| Rossinante | 6 | 7 | | | 7 |
| Festuca rubra trichophylla | | | | | |
| Borluna | 7 | 8 | | 8 | 7 |
| Mirador | 7 | 7 | | 8 | 7 |
| Pinafore | 7 | 8 | | 8 | 6 |
| Festuca trachyphylla | | | | | |
| Bornito | | | | | 7 |

| Grasart Sorte | Einstufung nach RSM 2023 | | | | |
|-----------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| | Zier- rasen | Gebrauchs- rasen | Strapa- zierrasen | Tiefschnitt- rasen | Land- schaftsr. |
| Lolium perenne | | | | | |
| Coletta | 7 | 8 | 9 | | 6 |
| Corsica | 8 | 9 | 9 | | 5 |
| Dickens 1 | 7 | 9 | 9 | | 6 |
| Double ^t | | 7 | 8 | | 6 |
| Esquire | | 7 | 8 | | 5 |
| Eurodiamond | | 8 | 9 | | 6 |
| Europitch | 7 | 9 | 9 | | 6 |
| Eventus | 8 | 9 | 9 | | 6 |
| Fabian ^t | 7 | 8 | 8 | | 7 |
| Gildara | 7 | 9 | 9 | | 7 |
| Jubilee EG | | 7 | 8 | | 5 |
| Oase | | 8 | 9 | | 6 |
| Passion | | 8 | 8 | | 6 |
| Rokade | | 8 | 8 | | 5 |
| Turfgold | | 6 | 8 | | 5 |
| Poa pratensis | | | | | |
| Anisha | | 8 | 6 | | 5 |
| Dauntless | | 8 | 7 | | 4 |
| Julius | | 9 | 8 | | 6 |
| Limousine | | 9 | 8 | | 6 |
| Lincolnshire | | 9 | 8 | | 6 |
| Miracle | | 8 | 6 | | 5 |
| Sombrero | | 9 | 7 | | 6 |
| Yvette | | 8 | 8 | | 6 |
| Poa supina | | | | | |
| Supreme ¹ | | 9 | 9 | | |

¹ Nur in Mischungen

^t tetraploide Sorte



Download
Kataloge

JULIWA-HESA

Mittelgewannweg 13
69123 Heidelberg
Tel. 06221-8266-0
Fax 06221-8266-33
www.juliwa-hesa.de